

빅조인에프정

BigJoin F T ab.

일반의약품

분류번호:319

【원료약품 및 그 분량】1정 중

■유효성분:	
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
시아노코발리민1000배산(시아노코발리민으로서 20μg)(KP).....	20mg
이노시톨(KP)	10mg
푸르실티아민(KP)	50mg
니코틴산아미드(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	25mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
γ-오리자놀(KP)	5mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 6.03mg)(KP)	10mg
■첨가제(타르색소): 청색1호알루미늄레이크, 적색40호, 황색5호알루미늄레이크	
■첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유), 콘드로이틴설페이트나트륨(기원동물:소, 사용부위:연골)	
■기타 첨가제: 경질무수구산, 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 산화티탄,스테아르산마그네슘,저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨,카르나우바납, 크로스보비돈, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스	

【성 상】갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등),
 - 각기
 - 눈의피로

【용법·용량】만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1정 식후복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1)인신염, 갑상염, 경구(먹는) 복용하는용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 1세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장(콩팥)장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 임부

- (8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy :말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (3) 철분이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (4) 고함량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60정/병, 120정(60정/병×2)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【소비자상담실】 02)521-2308

- 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준 (KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- 의약품용을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 이 문안은 (2019년 03월 21일) 작성되었으며 이후 변경된 내용은 미래제약 홈페이지 (www.miraepharmkorea.co.kr) 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용보고: 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

Rev.01

판매자: 일양약품(주) 경기도 용인시 기흥구 하갈로110

제조사: 미래제약(주) 경기도 안성시 공단2로 104