

※ 이 문서는 이 약을 사용하실 때 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관하십시오.

KGMP

우수약품지정업체

I-02

일반의약품

칼디쓰리플러스™ 정



【원료약품 및 그 분량】 1정(1.060mg) 중

■ 유효성분: 시트르산칼슘수화물(USP) 960mg

(칼슘으로서 202.24mg)

농축콜레칼시페롤(분말형)(EP) 5mg

(콜레칼시페롤로서 500IU)

■ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 포비돈,

폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】 1. 다음 경우의 비타민 D의 보급

- 임신, 수유기, 발육기, 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방

2. 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 2정을 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증

(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 심한증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

3) 심장·순환기계 기능 장애 환자

4) 신장장애 환자

5) 저단백혈증 환자

6) 강심배당체를 투여 중인 환자

7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.

- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진

2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

5) 우발적으로 과량복용 한 경우

6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 30정/병, 180정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 080-597-1020

문서개정일 : 2019.10.21

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

제조사:



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 함박동로 316 17B-2.

www.i-pharm.kr

판매자:



PHARMA

메타메스피어(주)



종이