

규격	100x230
종이	
접지	
삼진기획	

일반 의약품
분류번호 391

간장질환용제

우루리버정 100mg

(우르소데옥시콜산)

HT-180329

Urliver Tab. 100mg

【원료약품 및 분량】1정 중

유효성분 : 우르소데옥시콜산(KP)..... 100mg

첨가제(동물유래) : 유당(젓당)수화물 (기원동물 : 소, 사육부위 : 우유)

기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 포비돈

【성 상】 흰색의 원형 정제

【효능 · 효과】

- 다음 질환의 보조 치료 : 담즙(쓸개즙)분비 부전으로 오는 간질환, 담도(쓸개길)(담관(쓸개관), 담낭(쓸개))계 질환
- 만성 간질환의 간기능 개선
- 소장절제 후유증 및 염증성 소장 질환의 소화불량

【용법 · 용량】

성인 : 우르소데옥시콜산으로서 1회 50-100mg, 1일 3회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 성분에 과민증 환자
 - 2) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자(이담작용이 있으므로, 증상을 악화시킬 수 있다.)
 - 3) 전격성 간염 환자(증상을 악화시킬 수 있다.)
 - 4) 방사선비투과성 석회화된 담석 환자
 - 5) 비기능성 담낭(쓸개)환자, 급성 담낭(쓸개)염 환자
 - 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 7) 소아
 - 8) 신질환 환자
 - 9) 소화성궤양(급성위 · 십이지장궤양) 환자(점막자극작용이 있으므로, 증상을 악화시킬 수 있다.)
 - 10) 크론병과 같은 대장 및 소장염 환자
 - 11) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 다음 약물의 작용을 증가시킬 위험성이 있다 : 경구 당뇨병제(톨부타미드)
 - 2) 다음 약물은 이 약의 흡수를 방해한다.
 - 콜레스티라민, 콜레스티폴, 약용탄, 마그네슘 및 수산화알루미늄을 함유하는 제산제
 - 3) 담즙(쓸개즙)에서 콜레스테롤을 감소시키는 약물(예 : 에스트로겐 함유 경구용 피임제) 또는 혈액의 콜레스테롤을 감소시키는 약물(예 : 클로피브레트)
 - 4) 간에 손상을 주는 약물과 병용(함께 복용(사용))을 피한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 체장(이차) 질환 환자(원 질환을 악화시킬 수 있다.)
 - 2) 담관(쓸개관)에 담석이 있는 환자(이담작용이 있으므로, 담즙(쓸개즙)유체를 일으킬 수 있다.)
 - 3) 정맥류 출혈, 간성훈수, 복수(배물), 갑자기 간식이 필요한 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 구토, 드물게 배앓음, 변비, 가슴쓰림, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 때때로 가려움, 드물게 발진 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 간질환 폐렴 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상을 동반한 간질환 폐렴이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고, 의사, 치과 의사, 약사와 상의한다.
 - 4) 기타 : 드물게 전신권태감, 어지러움, 담석의 석회화, 간효소치의 증가(ALT, ALP, AST, γ-GT), 백혈구 감소가 나타날 수 있다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 치료 중 혈장의 간효소치(ALT, ALP, AST, γ-GT, 총 빌리루빈치)를 규칙적으로 검사한다.
 - 2) 과량투여로 인해 심각한 이상반응이 일어날 가능성은 적지만 필요한 경우 간기능 검사를 한다.
 - 3) 고령자(노인)에서 용량의 변경이 필요하다는 증거는 없지만 고령자(노인)는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 적절한 예방이 고려되어야 한다.
 - 4) 담석증 : 담석이 용해되는 시간은 보통 6-24개월이기 때문에 12개월 후에도 담석이 작아지지 않으면 치료를 중단한다. 치료성과에 대해 6개월에 한번씩 린트켄이나 초음파로 검사한다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 30정/병, 100정/병

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 한국휴텍스제약(주) 홈페이지(www.hutechs.co.kr)에서 확인해 주십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



한국 휴텍스 제약 (주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

설명서 작성일 : 180329

우수의약품제조관리기준

KGMP 적격지정업체