

벤포티아민100mg,
시아노코발라민 1000ug 함유

맥티진정

고함량 기능성 활성비타민



【원료약품 및 그분량】

· 유효성분 :	
벤포티아민(KP)	100mg
(티아민염산염으로서 72.31mg)	
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
비오틴(USP)	0.1mg
폴산(KP)	0.05mg
시아노코발라민(KP)	1000μg
이노시톨(KP)	100mg
콜린타르타르산염(DAB)	20mg
제피아스코르브산(별규)	52.1mg
(아스코르브산으로서 50mg)	
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	20mg
(비타민D로서 10IU)	
산화아연(KP)	30mg
(아연으로서 24mg)	
셀레늄함유건조효모(KP)	20mg
(셀레늄으로서 10.8μg)	
산화마그네슘(KP)	50mg
(마그네슘으로서 30mg)	
콜레칼시페롤농축물(분말형)(EP)	10mg
(비타민D로서 1000IU)	
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
감마오리자놀(KP)	10mg
· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)	
· 기타첨가제 : 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로스, 탭설드갈색(29B061)	

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】 1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 - 노년기 - 발육기 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. - 뼈, 이의 발육 불량 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(허리통), 어깨 결림 등, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로 3. 아연의 보급

【용법·용량】 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcomatosis : 원인을 알수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전환자 6) 이 약은 유당(젖당) 수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를

받고 있는 환자 2) 고옥살산 뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 소화성궤양, 만성궤양성 대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장·순환기계기능 장애환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 9) 신장결석 병력이 있는 환자 10) 임부 4. 다음과 같은 경우 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것, 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 붉은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용 하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 항 알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변화하여 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 080-990-8200(수신자부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다. ※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색을 참고하여 주십시오. ※의약품을 사용하기전에 반드시 첨부 문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. ※의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【제조사】

한국코러스
충청북도 제천시 강서로 30

【판매자】

영진약품
경기도 화성시 남양읍 무화로 66