

약효분류 : 391 간장질환용제

일반의약품 우수의약품
KGMP적격업체

050218


생약성분 함유 간기능 개선제

레가리버350 연질 캡슐

(밀크시슬엑스)

LEGA-LIVER 350 Soft Caps.

밀크시슬엑스 350mg



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,140mg) 중

유효성분: 밀크시슬엑스(생규[실리마린]으로서 196mg) 350.00 mg

첨가제(동물유래성분): 젤라틴(기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)

첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호

기타 첨가제: 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 에틸바닐린, 공기를, 황납

【성 상】 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색(검붉은 색)의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】 다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

【용법·용량】 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 등 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP*6), 120캡슐(60캡슐(10캡슐/PTP*6)*2)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 02-828-8291

【제조회사】 **부광메디카**

경기도 안산시 단원구 원시로 63 가동(지하층, 2층, 3층, 4층), 다동, 마동, 바동, 사동

【제조사】 **Rp Bio (주)알파바이오**

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의감게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서 작성일자 : 2018.05.02