

일반의약품 | 분류번호:234

메디알정 500mg

(알마게이트500mg)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분: 알마게이트(KP) ——— 500.0mg
기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

【성상】 흰색의 장방형 정제

【효능·효과】 다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선: 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 심트림

【용법·용량】 성인 및 12세 이상의 소아: 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액 저류(고임, 붓임)(부기) 환자 5) 임신 중독증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자

2 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음)

3 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약

물의 흡수배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.

(1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 질(제)제: 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3 시간 간격을 두고 복용한다. (2) 살리실산염: 신장의 배설을 증가시킨다.

2 신장애(신장장애) 환자: 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애(신장장애) 환자에게는 권고되지 않는다.

3 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람: 이 약의 알루미늄이온이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.

4 고령자

5 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관

출혈 증상이 있는 환자

6 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1 소화기계: 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2 주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

3 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에

보관 할 것.

【포장단위】 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

【제조(의)회사】 에스피씨(주) / 경기도 평택시 포승읍 평택항간길 386

【제조사】 (주)씨트리 / 경기도 남양주시 경

※ 의약품을 사용하기 전에 문서를 주의깊게 읽고, 문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 본 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 ([http:// drug.mfds. go.kr](http://drug.mfds.go.kr)) 의 의약품정보를 참조하십시오. ※ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성일자(2018.05.18) 이후 변경된 내용은 소비자 상담실(031-681-4670)으로 문의하시기 바랍니다. ※부작용 보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)



8 806697 002714

	5 mm
제조 번호	40 * 20 mm
사용 기한	5 mm

제조
번호

사용
기한