

기능성 종합 비타민미네랄

더블액티브

Active

비타민D
1000IU

코큐텐

비타민B
7종

비오틴

체력저하 · 눈의 피로 · 어깨결림

구내염 · 잇몸출혈 기미, 주근깨

【원료약품 및 그분량】

· 유효성분 :

벤포티아민(KP)	25.0mg
(티아민염산염으로서 18.08mg)	
푸르실티아민(KP)	25.0 mg
리보플라빈 (KP)	50.0 mg
니코틴아미드(KP)	20.0 mg
판토텐산칼슘 (KP)	20.0 mg
비오틴(USP)	0.2 mg
폴산(KP)	0.4 mg
제피아스코르빈산(별규)	650.0 mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	20.0 mg
(비타민D로서 10IU)	
신화아연(KP)	37.35 mg
(아연으로서 29.92 mg)	
콜레칼시페롤농축물(분말형)(EP)	10.0 mg
(비타민D로서 1,000IU)	
유비데카레논(KP)	10.0 mg
감마오리자놀(KP)	10.0 mg

· 첨가제 (동물유래) : 유당수화물(소, 우유)

· 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 저치환도이드, 옥시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 폴리이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 탭실드칼색 (29B061)

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅 정제

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, C의 보급 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기 2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. - 뼈, 이의 발육불량 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통 (요(허리)통, 어깨 결림 등), 구각염(입꼬리 염), 구순염(입술염), 구내염 (입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의피로 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 - 잇몸출혈, 비출혈(코 피) 예방

3. 아연의 보급

【용법 · 용량】 만 12세이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1)고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomoidosis : 원인을 알수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5)이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2.이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할것) 1)의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산 뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태) 3)임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 4) 심장 · 순환기계기능 장애환자 5) 신장장애 환자 6) 저단백질증 환자 7) 통풍환자 또는

신장결석이 있는 환자 8) 신장결석 병력이 있는 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것, 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은변, 변비, 위부불쾌감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구내염(입안염), 발진, 발적, 저혈압, 폐부종 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길수 있다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 항 알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용시 주의사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2)직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기한】 제조일로부터 36개월

【소비자상담실】 070-4924-7632

HANKOOK KORUS PHARM CO., LTD.

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다. ※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색을 참고하여 주세요. ※의약품을 사용하기전에 반드시 첨부 문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. ※의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【제조사】

한국코러스
충청북도 제천시 감저로 30

【판매자】

광동제약(주)
경기도 평택시 산단로 114