

※ 이 문서는 이 약을 사용하시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관하십시오.

KGMP
우수약품지정업체

I-00

정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내이상발효

락토피 캡슐 300mg

일반의약품
분류번호: 237



락토바실루스아시도필루스균

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 (470mg) 중

■ 유효성분: 락토바실루스아시도필루스균(별규).....300mg(생균수로서 1×10^8)

■ 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

■ 기타첨가제: 규산알루미늄산마그네슘, 스테아르산마그네슘, 상부백색, 하부 연화색 불투명캡슐

[성상] 백색 내지 미황색의 가루로 충전된 상부 백색 불투명, 하부 연화색불투명의 경질캡슐제

[효능·효과] 정장, 변비, 묽은 변, 복부팽만감, 장내 이상발효

[용법·용량] 1. 성인 및 12세 이상의 소아 : 락토바실루스아시도필루스균으로서 1회 300 mg(생균수로서 1×10^8 개)을 1일 1 ~ 3회 복용한다.

2. 8세이상 12세 미만의 소아 : 이 약으로서 1회 300 mg (생균수로서 1×10^8 개)을 1일 1 ~ 2회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 면역체계가 심각하게 손상된 환자(예, 후천성면역결핍증후군(AIDS) 환자, 백혈병 환자, 악성종양 환자, 장기이식 후, 방사선 치료 후, 화학요법 후, 장기간의 고용량 스테로이드 치료 후 등)

2) 고열을 동반하거나 혈액이 섞인 설사가 있는 1세 미만의 소아

3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 밀폐용기, 건냉암소(15°C 이하)보관

[포장단위] 30캡슐/병, 500캡슐/병

[소비자상담실] 080-597-1020

[제조외리지] (주)아이월드제약 / 인천광역시 남동구 함박외로 316 17B-2L

[제조자] 대한뉴팜(주)/경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

개정일: 201805

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 함박외로 316 17B-2L
www.i-pharm.kr

