

근이완제 파렉손[®]

(에페리손염산염)

전문의약품

분류번호:122

【현탁액용량】 1정 중

- 유효성분: 에페리손염산염(별규).....50.0mg
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(동물기원: 소, 사용부위: 우유), 젤라틴(동물기원: 소, 사용부위: 가죽)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 백당, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 아라비아고무, 옥수수전분, 침강탄산칼슘, 카르나우바인, 툴코, 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 흰색의 원형 당의 정제

【효능·효과】

1. 근골격계질환에 수반하는 통통성 근육연축: 경건완중후군, 건관절주위염, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비: 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술 후 후유증(뇌척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 측색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수신경변, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

성인: 염산에페리손으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절한 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자,
 - 2) 중증의 근부력증 환자,
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(Glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자,
 - 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다).
3. 부작용
 - 1) 속: 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 간장: 드물게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 신장: 드물게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액: 드물게 빈혈 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 정신신경계: 때때로 불면, 졸음, 두통, 사지마비, 드물게 몸의 굳어짐, 사지떨림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계: 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드물게 복부팽만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 비뇨기계: 드물게 요폐, 요실금, 잔뇨감이 나타날 수 있다.
 - 9) 전신증상: 때때로 두통, 근육통, 비통, 전신권태감, 드물게 어지러움, 근긴장저하 등이 나타날 수 있다.
 - 10) 기타: 때때로 안면홍조, 드물게 발한, 부종이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여 중에 두통, 근육통, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감람 또는 투여를 중지한다.
- 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여 중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
 - 이 약의 유사작용인 염산톨페리손과 메토키카를을 병용 시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
 - 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).
8. 고령자에 대한 투여
 - 일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 500정

【제조자】 초당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 발명로 381

【제조·유통사】 (주)한국파마

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87

- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품사전(<http://drug.mds.go.kr/>)의 '의약품 검색'란을 참고하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이시드락)에 보고마당-안전성정보-의약품우해사례보고에 알리도록 합니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질·변패 또는 소손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 정부에서 고시한 소비자 피해보상규정에 의거 상당한 소비자의 피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.koreapharma.co.kr) 또는 ☎ 02-558-1277에서 확인 할 수 있습니다.

제품문의처 02)558-1277(마케팅)

최종개정년월일 2018.05.14

RAS-1801

건강한 미래 아름다운 동행

KP 한국파마
KOREA PHARMA

www.koreapharma.co.kr

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 87