



일반의약품

KGMP적격업체

분류번호 03190



【원료약품 및 그 분량】1정 중

유효성분:	
벤토티아민(KP)(티아민염산염으로서 18,075 mg)	25.0 mg
리보플라빈(KP)	20.0 mg
리보플라빈부타레이트(KP)	5.0 mg
니코틴아미드(KP)	25.0 mg
판토틸산칼슘(KP)	100.0 mg
피리독신염산염(KP)	20.0 mg
피리독신포스페이트수화물(KP)	5.0 mg
폴산(KP)	0.2 mg
히드록소코발리나제트트린염(KP)(히드록소코발린으로서 47.8 µg)	0.05 mg
제피아스코르빈산(별규)(아스코르브산으로서 250 mg)	257.7 mg
비오틴(KSP)	0.25 mg
피토나딘5%(별규)(비타민D로서 30 µg)	0.6 mg
플리칼시페롤충분량(비타민D로서 500 IU)(동물유래성분: 양, 양모)	5.0 mg
토코페롤비세이트트리스테산(KP)(비타민E로서 10 IU)	20.0 mg
아시나롤(KP)	25.0 mg
셀라닐함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 13.5 µg)	25.0 mg
L-시스티딘(KP)	60.0 mg
산화아연(KP)(아연으로서 12.03 mg)	15.0 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 30.2 mg)	50.0 mg
우루스데옥시콜산(KP)	10.0 mg
유비데카레논(KP)	5.0 mg
칼마오리저놀(KP)	3.0 mg
원재료: 감질무수산화, 미결정셀룰로오스, 스테아르산아그네소, 오파드라미200분홍(200F240013), 오파드라미에프엑스오크(62W 25547), 오파드라미하늘색(20A680000), 크로스카멜로소나트륨, 폴리비닐피롤리돈6000, 히드록시프로필셀룰로오스	

【성상】분홍색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, C, D, E의 보충
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노인기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요로결핵, 아제컬림 등), 구강염(임프린), 구순염(임프린), 구내염(임프린), 설염(허염), 습진, 피부염
 - 각기 - 눈피로 - 껌, 이의 발육불량 - 구루병의 예방 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착기미, 주근깨기미 완화 - 잇몸출혈 - 비출혈(코피) 예방

【용법·용량】 12세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1회 2정 식후 복용
 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 영아
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
 - 4) 입부 및 입안과 잇몸 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 5) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
 - 6) 소화 장애, 만성콩팥병대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 7) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 9) 동종환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
 - 10) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 11) 입부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(종혈)에 붉어짐, 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부위)팽만감, 붉은 변점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부병, 멍·홍반·자국, 발모, 조골증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부위)통증, 저혈압, 때때로(부기)
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 감소할 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
 - 3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 8) 대령투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 우혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 9) 알칼로스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용·사용) 투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주세요.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
 - 3) 각종 요강(사이에 혈관의 건조를 방해할 수 있습니다.)
 - 4) 오용(잘못 사용)로 병하게 하여 임상 검사에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 5) 녹차, 홍차 등 단란을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
 【사용기간】 제조일로부터 36개월
 【유통기한】 60개월, 120개월(60개월×2)
 * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자기본법해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
 * 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하려, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 * 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nfdrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
 첨부서류 작성일: 2022년 01월 11일

【판매처】(주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 [제조처] (유)한정제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주신대로 301 2로 596 TEL.090-280-0033 1~3층, 5층, 봉동로 705