



0004522206

VITAMIN B

고함량 활성형 비타민

비나폴로 100정

VENAPOLLO 100 Active Vitamin B Complex

벤포티아민 100mg 함유

비타민 B₁·B₂·B₆·B₁₂ 100mg



[참조약물 및 그 분량] 이 약 1정(1,365mg) 중

• 유효성분

비타로틴20%과립(별규)	18.5mg
아스코르브산97%과립(아스코르브산으로서 100mg)(별규)	103.09mg
벤포티아민(티아민염산염으로서 72.3mg)(KP)	100.0mg
리보플라빈(KP)	100.0mg
니코틴아미드(KP)	100.0mg
판토텐산칼슘(KP)	100.0mg
피리독신염산염(KP)	100.0mg
비오틴(USP)	0.25mg
몰산(KP)	0.2mg
시아노코발라민(1000mcg)(시아노코발라민으로서 100μg)(KP)	100.0mg
수아인산수소칼슘(칼슘으로서 8.83mg, 인으로서 6.82mg)(USP)	30.0mg
산마그네슘(마그네슘으로서 30mg)(USP)	49.75mg
산화아연(아연으로서 25mg)(USP)	31.12mg
셀레늄함유천조호모(셀레늄으로서 50μg)(KP)	23.21mg
우르소데옥시콜산(KP)	15.0mg
유비데카렌은 10%(유비데카렌으로서 5mg)(별규)	50.0mg

• 기타 첨가제 : 규하미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 오파드-드라이하이드레이트, 오파드-드라이하이드레이트(RSF15000A), 크로스 폴리머, 락트

[성상] 밝은 황갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음경우의 비타민 A, B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신, 수유기
 - 병중, 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 근육 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부병, 눈의 건조증의 완화, 야맹증(밤에 잘 보이지 않음)
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 아연의 보급

[용법·용량]

일 12세 이상 및 성인 일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

- 1. 경고**
 - 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외).
- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태(환자, 유육종증(sarcomatosis) : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고칼슘혈증 환자(hypercalcemia) : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 외국에서 임신한 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를

- 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료를 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만을 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 자간백혈증 환자
- 8) 감성배당체를 투여 중인 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 10) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상단 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증, 관절부종, 설사, 붉은 변, 변비, 저혈압, 얼굴발진, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부진수축(심장박동정지), 중추 신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡기 약화, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500mg - 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 몰산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 물혈 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 8) 장기간 고용량의 비타민 A(비타카로틴)로부터 전한 것(것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈약화) 위험을 높일 수 있다.
- 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 10) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 장해전 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 3) 각종 요검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변화시켜 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.
- 7. 저장상의 주의사항**
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1-30°C) 보관

[포장단위] 120정(60정/BOX), 30정/BOX

※ 본 의약품은 KCMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 약점을 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 이 첨부문서의 작성일자(2018년 05월 31일) 이후 변경된 내용의 확인은 식품의약품안전처 온라인약도서관(http://drug.mds.go.kr) 또는 홈페이지(http://www.yuyu.co.kr)나 크로비스비서(수신시간:평일 08:00-07:00)으로 하시기 바랍니다.

[제조사] **yuyu (주)유유제약**
YUYU PHARMA

서울사무소 : 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩
본사 : 공창 · 충북 제천시 바이오패의 1로 94