

코만코정

조제용
일반의약품
분류번호 : 141

(페닐레프린염산염 · 클로르페니라민말레산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

■ 유효 성분 : 페닐레프린염산염(KP) 10mg
클로르페니라민말레산염(KP) 4mg

■ 첨가제(타르색소) : 레이크청색1호, 적색40호

■ 첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(기원:소,우지), 유당수화물(기원:소,우유)

■ 기타 첨가제 : 딸기향코트, 미결정셀룰로오스, 아스파탐, 인산수소칼슘수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 합수아산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 연분홍색 장방형 정제

【효능·효과】

– 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
– 부비동염에 의한 비축혈(코막힘)의 일시적 완화

【용법·용량】

– 성인(만 12세) : 4시간마다 1정씩 복용하되, 24시간 동안 6정을 초과하지 않거나, 의사의 지시에 따른다.
– 만 6~12세 소아 : 4시간마다 1/2정씩 복용하되, 24시간동안 3정을 초과하지 않거나, 의사의 지시에 따른다.
– 만 5세 이하 소아 : 의사의 지시에 따른다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤노증 환자에는 투여하지 말 것.
□ 1일 허용량제한
아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소량 사용)할 것.
60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자
- 2) 특이체질환자
- 3) 수유부
- 4) 중증의 고혈압환자, 중증의 광상동맥질환환자, MAO저해제 치료를 받고 있는 환자
- 5) 협우각성 녹내장, 뇨 저류(소변이 고임), 소화성궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이 차거나, 호흡곤란이 있는 환자
- 6) 진정제, 신경안정제를 투여 받고 있는 환자
- 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase

deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것

만성기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 갑상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선비대로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 말 것

4. 부작용

- 1) 교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있다.
; 공포, 불안, 긴장, 진전(떨림), 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관허탈
- 2) 페닐에프린에 과민인 사람은 빈맥(빠른맥), 동계(두근거림), 두통, 어지러움, 오심(구역)등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있다. 그러나, 페닐에프린을 적정량 투여하면 이런 부작용이 나타나지 않는 안전한 약물이다.
- 3) 항히스타민제에 과민인 사람은 중증도의 진정작용을 나타낼 수 있다.
- 4) 항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈(목마름), 어지러움, 쇠약, 식욕부진, 오심(구역), 구토, 두통, 신경과민, 다뇨(소변량과 다)증, 가슴앓이, 복시(겹보임), 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염 나타날 수 있다.
- 5) 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등의 졸음을 증가시킬 수 있다.
- 6) 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나, 고열을 동반할 때는 의사와 상의할 것
- 2) 이약의 복용 중에는 알코올성 음료를 피한다.
- 3) 이약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 할 것
- 4) 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량 복용 시에는 의사와 상의한다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의할 것

6. 보관 및 취급상의 주의

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 500정/병

【제조사】 코오롱제약(주) (대전광역시 대덕구 문평서로18번길 45)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2018년 05월 08일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지(www.wooridulpharm.com) 또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

제조의뢰자
우리들제약(주)

www.wooridulpharm.com

본사·공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(소비자상담실) 080-080-4211