

근육경련 및 혈액순환 개선제

마그포스액티브

연질캡슐

[일반의약품]

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를
주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



【원료약품 및 그분량】 1연질캡슐 중

■ 유효성분 :

산화마그네슘(KP)	349.0mg	리보플라빈(KP)	25.0mg
(마그네슘으로서 210.48mg)		피리독신염산염 (KP)	50.0mg
토코페롤아세테이트(KP)	500.0mg	시아노코발라민 (KP)	500.0μg
(비타민E로서 500 I.U)		γ-오리자놀 (KP)	5.0mg
벤포티아민(KP)	25.0mg	마늘엑스(100→1)(생구)	5.0mg
(티아민염산염으로서 18.08mg)			

■ 첨가제(동물유래성분) : 속산산젤라틴(소, 가축), 젤라틴(소, 가축)

■ 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호

■ 기타 첨가제 : 농굴리세린, 레시틴, 백랍, 산화티탄, 에틸바닐린, 정제수, 콩기름, 폴리소르베이트80

【성상】 회백색의 유상물질(거름상태물질)이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 각기 · 눈의피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥) 장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 · 위부 불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【사용기한】 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

【포장단위】 10캡슐/PTP, 60캡슐(10캡슐/PTP x 6), 120캡슐((10캡슐/PTP x 6) x 2)

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조의뢰자·판매원:코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사:한국프라이머제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

최초 작성연월일 : 20180612

❖ 코오롱제약

PR1 180618