

메가트루 파워

일본의약품
無티로세스

분류번호 : 319(7타의 비타민제)

● 메가트루파워워경 개요 및 특징

메가트루파워워경은 체내 에너지 생성에 필요한 비타민B군이 고탄량 함유된 비타민 및 메타할 복합 영양제입니다. 활성형 비타민B1인 베포티아민을 비롯한 고탄량 비타민B군이 들어있어 육체피로, 세력저하, 눈의 피로, 근육통, 신경통 등에 효과적이며, 항산화성분인 비타민C, 셀레늄, 아연, 체내에서 부족하기 쉬운 비타민D, UDCA, 등 현대인에게 필요한 총 17종의 영양소를 보강하였습니다. 또한 1일 1정 용법으로 더욱 간편하게 복용할 수 있습니다.

● 원료약품 및 분량 1정 중

■ 유효성분

베포티아민(비타민B1)(K1)(타이민염산염으로서 72.3mg)	100mg
리보플라빈(비타민B2)(K2)	100mg
나이코틴아미드(비타민B3)(K3)	30mg
판토텐산칼슘(비타민B5)(K5)	30mg
피리독신염산염(비타민B6)(K6)	100mg
시아노코발린 100배산(비타민B12)(발류)(시아노코발린으로서 100μg)	10mg
아스코르브산과립 97%(비타민C)(발류)(아스코르브산으로서 50mg)	51.6mg
글루타미산과립(8P)(비타민D로서 1,000IU)	10mg
피토나디온5% 건조분말(발류)(비타민K으로서 60μg)	1.2mg
d-비타민 1%(발류)(d-비타민으로서 0.1mg)	10mg
폴산(엽산)(USP)	0.4mg
이노시톨(KP)	50mg
폴리타르타르산염(DAB)	50mg
셀레늄 함유 건조효소(Se)(K7)(셀레늄으로서 12.5μg)	23.2mg
유로스테로이드(UDCA)(K8)	30mg
산화아연(Zn)(K9)(아연으로서 25mg)	30.9mg
산화마그네슘(Mg)(K10)(마그네슘으로서 50.07mg)	83mg

■ 첨가제

미정량성분: 크로스폴라본, 아산화구소, 스테아르산, 마그네슘, 오파이드, 톨루엔(AmB884640008), 크리나우라민

● 성상 분용성의 타원형 필름코팅정



● 효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 D, B1, B2, B6, C의 보급

· 육체피로 · 임신 · 수유기 · 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 · 발육기 · 노년기 · 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

- 비타민D(골다강화제과립) : 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방
- 비타민B(베포티아민) : 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요(하리통, 어깨관절 등)) · 각기 · 눈의 피로
- 비타민B2(리보플라빈), 비타민B6(피리독신염산염) : 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부병
- 아연의 보급

● 용법·용량 만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용

※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다

1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 생애 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다

1) 인산염, 칼슘염, 정구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오

1) 만 1세 미만의 경이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보정장적인 사실을 하는 어린이 4) 고칼슘혈증 환자(hypercalcaemia : 요중에 칼슘의 수산염이 배설되는 상태) 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다. 6) 소화장애, 만성위장장애, 국한성(특정 부분)에 나타나는 대장염 등의 위장질환 환자 7) 심장판막(가슴)에 결석이나 신장(콩팥)결석에 환자 8) 지단백질증 환자 10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자 11) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 12) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 처방문서를 소지하십시오

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 물은 변, 배변, 부종(수종), 심장박동정지, 중추신경계 기능저하, 피부염, 탈모, 호흡기 악화, 발모, 조골증, 위장장애, 소화장애, 상복부(배부)팽창, 저혈압, 피부증(부기) 2) 장기간 고통을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경 또는 신경병성 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당(포도당)내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 7) 항알로스테론제, 트라마돌과 병용(함께 복용)투여시 고통완화제를 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 8) 무발적으로 고통완화 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오. 3) 각종 요양사에게 알람의 검출을 방해할 수 있습니다. 4) 요를 병실로 변하여 하여 임상경시제에 영향을 줄 수 있습니다. 5) 낙상, 흉상 등 단락을 함유하는 지는 복용중, 복용전후에는 피하십시오

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오염(갈뚝 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다

● 사용기한 외투포장에 표기

● 포장단위 60정, 120정

● 저장방법 기밀봉기, 실온(1 ~ 30℃)보관

※ 정제를 개봉 후에는 뚜껑을 꼭 닫아주세요! 본 제품은 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡습)되어 변색할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약품들은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체의 약품으로 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다.

이 제품은 정부의 "소비자안전관리기준"에 의해 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 이 처방문의 작성현일 이후 변경내용은 온라인의약품도판(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피하구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부서 작성현일 : 2018년 6월 7일



제조사

유한양행

본사 : 서울특별시 동구로 74
중앙 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219

홈페이지 : www.yuhan.co.kr 소비자상담실 : 080-024-1188(수신자 요금부담)