

## 원료약품 및 분량(1캡슐 중)

- 유효성분 : 아세트아미노펜(KP) ..... 180.00mg  
브로페니라민말레산염(BP) ..... 2.66mg  
수도아페드린염산염(USP) ..... 15.00mg  
리보플라빈(KP) ..... 2.00mg
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 락색소, 산화티탄, 솔비톨스페살글리세린블렌드, 정제수, 젤라틴, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 폴리에틸렌글리콜4000, 프로필렌글리콜, 홍화황색소

**성상** : 황색의 내용물을 함유한 연한 주황색의 타원형 연질캡슐

ID CN

## 효능 · 효과

감기의 증상상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상) 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

## 용법 · 용량

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

## 사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

- 경고**  
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
  - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
  - 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
  - 만3개월 미만의 영아(갓난아기)
  - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.  
진해(기침을 그치게 함)가담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알약, 알레르기용약)
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.  
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
  - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 유발하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
  - 만 3 개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
  - 보인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
  - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
  - 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 뚫)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
  - 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
  - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
  - 다음과 같은 기침이 있는 사람  
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.  
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
  - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 뚫)곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
  - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한증상) 증상이 나타난 경우
    - 속(아나필락시스(과민성쇼크)) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
    - 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴피사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
    - 천식
    - 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있습니다.
    - 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.
  - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
  - 장기간 계속 복용하지 마십시오.
  - 복용시에는 음주하지 마십시오.
  - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
  - 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
  - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
  - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
  - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

※1291501-1180706

**저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**포장단위** : 10캡슐

- 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 온도가 높은 곳에 보관시 변형될 수 있으므로 되도록 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2018년 7월 6일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지 ([www.ildong.com](http://www.ildong.com))에서 확인할 수 있습니다.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

판매자 : **ILDONG 일동제약**

본사 서울특별시 서초구 바우외로27길 2  
공장 경기도 안성시 공단로 25  
소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

제조사 : **Rp Bio (주)알피바이오**

경기도 화성시 향남읍 제막공단4길 35-7

※1291501-1180706