

기침 가래 독아플때

사포날® 과립

[원료약품 및 분량] 1포(1.0g) 중

유효성분: 길경가루(생규) 66.67mg
 감초가루(생규) 50.00mg
 벤조산나트륨카페인(KP) 10.00mg
 노스카핀(KP) 10.00mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 2.00mg
 트리메토클놀염산염수화물(JP) 1.57mg(트리메토클놀염산염으로서 1.5mg)
 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 젖)
 기타 첨가제 : 용뇌, 크로스카르멜로오스나트륨, L-멘톨

[성상] 베이지색의 과립제

[효능·효과] 기침, 가래, 천식

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3~4회 식후 및 취침시 1포씩, 물과 함께 또는 물 없이 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- (1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 만 3개월 미만의 영아
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- (2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것. 다른 전해거담제, 감기약, 항히스타민제를 함유 하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약), 진정제
- (3) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
- 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진로 를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등 을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기), 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변)을 늦추는 등 관통 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- (4) 다음과 같은 기침이 있는 사람
- 출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- (5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 배뇨(소변을 늦추)곤란, 목마름(지 속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압 이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속 하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(체액 고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - ② 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하 고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- (6) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 복용시에는 음주하지 말 것.
 - 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린 산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨 혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- (7) 저장상의 주의사항
- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 1g/포 × 10포

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://drugsafe.or.kr>) 의약품유 해사례보고에 알리도록 하십시오.

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매



부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 능안로 47

113018

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 www.bukwang.co.kr

※ 이 첨부서 작성일자(2018.11.30) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.