

활성생균 정장제

락비오캡슐

(바실루스리케니포르미스균)

Lacbio Cap.

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 바실루스리케니포르미스균(별규) 250 mg
(바실루스리케니포르미스균으로서 2.5×10^8 마리)
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 상하부 흰색의 경질캡슐

[성상] 흰색의 가루가 든 상 · 하부 흰색의 캡슐제

[효능 · 효과] 급 · 만성장염, 급 · 만성설사, 급성이질, 각종원인에 기인한 장내 이상발효

[용법 · 용량]

- 성인 : 1회 2캡슐 1일 3회 복용
- 유아 : 1회 1캡슐 1일 3회 복용
- 유아의 경우 캡슐내용물을 소량의 물이나 우유에 타서 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

본 제는 항생물질과 병용투여하여도 되나 시프로플록사신, 이미페넴, 실라스타틴나트륨과의 병용투여는 피하는 것이 좋다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4. 소아에 대한 투여
3개월 미만의 영아에게 투여할 경우 약사 또는 의사와 상의 한다.
5. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온($1 \sim 30^\circ\text{C}$)보관

[포장단위] 30캡슐, 300캡슐

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
의약품 부작용 피해구제신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인 의약도서관(drug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자 상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2017. 07. 12 (Rev. 0)