

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우, 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.



분류번호 : 319 일반의약품

고령량 콘드로이틴설페이트나트륨 600mg + 황산티아민B 복합제

본타프600골드정

BONETOP 600GOLD Tablets

[원료약품 및 분량] 1정 중

유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨 (KP)	600 mg
푸로셀타이민(KP)	50 mg
니코틴산아미드(KP)	50 mg
아노시톨(KP)	25 mg
콜린타르타르산염(LSP)	20 mg
판토텐산칼슘(KP)	15 mg
피라독신염산염(KP)	10 mg
시아노코발라민1000배산(KP)	10 mg (시아노코발라민으로서 10μg)
리보플라빈(KP)	6 mg
γ-오라자놀(KP)	5 mg
콜레칼시페롤과립(별과)	0.5mg(콜레칼시페롤로서 50 IU)

[동물실험성분]

- ※ 콘드로이틴설페이트나트륨(기원동물 - 소, 사용부위 - 연골)
- ※ 콜레칼시페롤과립(콜레스테롤; 기원동물 - 양, 사용부위 - 양모(라놀린))
- 첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색1호알루미늄베레코
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분콜리클산나트륨, 크로스카르멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프록셀로스

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음경우의 티아민 D, B₁, B₆, B₁₂의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시
 - 발육기
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 티아민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의피로

【용법·용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomatosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라시클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람에게는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 티아민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 신장·순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자

- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감성 배당체를 투여 중인 환자
- 9) 신장 결석 병력이 있는 환자
- 4 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심한복통, 구취, 피부발진
 - 2) 피로독신을 일일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 3) 출산이 부족한 환자에게 티아민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 4) 고령량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 건선상을 일으킬 수 있다.
 - 5) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 6) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 7) 항알도스테론제, 트리아멘텐과 병용함께 복용(사용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 7타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용·잘못 사용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 45정/병

【문의전화】 본사 : (02)021-9300 소비자 상담실 : 080-029-1897(수신자 요금부담)

【제조·판매처】 동화약품(주), 충청북도 충주시 충주산단로 167

【제조지】 (주)세트리, 경기도 남양주시 경강로 27

본 의약품은 KCPMP 품질관리를 받은 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공판거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 사항은 식품의약품 안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※ 이 첨부서 작성일자(2018년 08월 21일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물관리전관리원(1644-6223)



동화약품

SINCE 1977