

※ 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

흡수율을 높이는 비타민D 마그네슘 함유 캡슐제

엑티본

연질
캡슐

일반의약품
분류번호 321
KGMP 적격업체

[유효성분] 1캡슐 중

- 글루콘산칼슘수화물(IP) 170.0mg (칼슘으로서 15.2mg)
- 인산수소칼슘수화물(USP) 590.0mg (칼슘으로서 137.41mg, 인으로서 106.19mg)
- 농축콜레칼시페롤(유상)(BP) 1.0mg (비타민D로서 1,000 IU)
- 산화마그네슘(KP) 20.0mg (마그네슘으로서 12.06mg)

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민D의 보급
 - 임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

[용법·용량] 만 12세이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 4) 신장결석 환자
 - 5) 심한 증상의 신부전 환자
 - 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 감심배당체를 투여 중인 환자
 - 7) 신장결석 병력이 있는 환자
 - 8) 임부
 - 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여 한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추 신경계 기능저하

- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 장기간투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
 - 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[첨가제]

- 타르색소 : 적색40호, 황색5호, 청색1호
- 기타 첨가제 : 콩기름, 아자경화유, 황납, 레시틴, 폴리소르베이트80, 젤라틴, 농글리세린, 비결정성 소르비톨액, 산화티탄

[성상] 유백색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[제조의뢰자] 위더스제약(주) / 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103

[제조사] 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오벨리3로 30

[판매자] 한미헬스케어(주) / 서울특별시 송파구 위례성대로 14 한미타워 5, 6, 12F

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 개정일자(2018년 07월 05일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)3486-7474

첨부문서 최종 개정연월일 : 2018. 07. 05

5026000-V-000