



효과빠른 액상 진통제, 이지엔6 에이스

특허받은 액상 기술의 이지엔6는 녹는 속도와 흡수가 빠르고,
약효가 빠르며, 복용하기가 편리한 진통제입니다.

특 장 점

1. 액상형으로 빠른 진통 효과
2. 아세트아미노펜 성분으로 공복에도 복용 가능
3. 카페인, 타르색소가 없어 안심하고 복용
4. 복용자의 나이, 몸무게 등 신체적 조건과 증상에 따라 복용량 조절이 편리

주 효능·효과



해열

감기, 몸살 등으로 인해 열이 나시는 분



두통

스트레스, 긴장, 질병으로 인해 머리가 아프신 분



신경통

시리고 찢어질 통증이 있으신분

【효능·효과】

1. 주효능·효과 감기로 인한 발열 및 동통(통증), 두통, 신경통, 근육통, 월경통, 염좌통(뻥 통증)
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다. 치통, 관절통, 류마티양 동통(통증)

【용법·용량】 만 12세 이상 소아 및 성인: 1회 2캡슐씩 1일 3~4회 (4~6시간마다) 필요시 복용한다.

1일 최대 4그램 (12캡슐)을 초과하여 복용하지 않습니다. 이 약은 가능한 최단기간동안 최소 유효용량으로 복용합니다.

【원료약품 및 그 분량】 - 1캡슐 중 -

유효성분 : 아세트아미노펜(KP) 325mg
기타첨가제 : 소르비톨 소르비탄액, 인나트색소, 정제수, 젤라틴, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜

【성상】 미황색의 투명한 액이 든 주황색의 투명한 장방형 연질캡슐

AAP

【사용상의 주의사항】

1. **경고** ① 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다. ② 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포성급성간염 발진성 괴혈성괴혈성(AGEF), 스테프스-존슨 증후군(SSJ), 독성 표피 괴사증후군(TSG)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타날 경우 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다. ③ 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대용량 (4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량 (4,000mg)을 초과하여 복용해서는 안 되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

① 이 약에 과민증 환자 ② 소화성궤양 환자 ③ 심한 혈액 이상 환자 ④ 심한 간장애 환자 ⑤ 심한 신장장애 환자 ⑥ 심한 심장기능저하 환자 ⑦ 아스피린 천식비스테로이드성 소염항염제에 의한 천식발작 유발 환자 ⑧ 병력이 있는 환자 ⑨ 다음의 약물을 복용한 환자: 비르비탈계 약물, 삼환계 항우울제, ⑩ 알코올을 복용한 사람

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

① 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ② 신장장애 또는 그 병력이 있는 환자 ③ 소화성궤양의 병력이 있는 환자 ④ 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자 ⑤ 급성심장기능저하 환자 ⑥ 아스피린 천식비스테로이드성 소염항염제에 의한 천식발작 유발 환자 ⑦ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ⑧ 심한 신장장애 환자 ⑨ 심한 심장기능저하 환자 ⑩ 심한 혈액 이상 환자 ⑪ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ⑫ 심한 신장장애 환자 ⑬ 심한 심장기능저하 환자 ⑭ 심한 혈액 이상 환자 ⑮ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ⑯ 심한 신장장애 환자 ⑰ 심한 심장기능저하 환자 ⑱ 심한 혈액 이상 환자 ⑲ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ⑳ 심한 신장장애 환자 ㉑ 심한 심장기능저하 환자 ㉒ 심한 혈액 이상 환자 ㉓ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㉔ 심한 신장장애 환자 ㉕ 심한 심장기능저하 환자 ㉖ 심한 혈액 이상 환자 ㉗ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㉘ 심한 신장장애 환자 ㉙ 심한 심장기능저하 환자 ㉚ 심한 혈액 이상 환자 ㉛ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㉜ 심한 신장장애 환자 ㉝ 심한 심장기능저하 환자 ㉞ 심한 혈액 이상 환자 ㉟ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㊱ 심한 신장장애 환자 ㊲ 심한 심장기능저하 환자 ㊳ 심한 혈액 이상 환자 ㊴ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㊵ 심한 신장장애 환자 ㊶ 심한 심장기능저하 환자 ㊷ 심한 혈액 이상 환자 ㊸ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㊹ 심한 신장장애 환자 ㊺ 심한 심장기능저하 환자 ㊻ 심한 혈액 이상 환자 ㊼ 심한 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ㊽ 심한 신장장애 환자 ㊾ 심한 심장기능저하 환자 ㊿ 심한 혈액 이상 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상습적 과다 복용이 의심되는 경우 즉시 중단하십시오.

① 속 속 아세트아미노펜 중성아세트아미노펜·효율적인, 몸이 붉어짐, 발진, 두드러기 등, 천식발작, ② 혈액, 혈소판 감소, 괴혈성괴혈성, 파골세포괴혈성, 메테모르포비즘, 혈소판기능 저하출혈성, 연질, 창상, ③ 과민증, 과민증발작, ④ 효능적인, 몸이 붉어짐, 발진, 두드러기 등, 천식발작, ⑤ 소화기, 구역, 구토, 식욕부진, 장, 복통, 위장장애, 소화성궤양, 천공궤양, 등의 위장관계 이상반응, ⑥ 피부 발진, 알레르기 반응, 피부발진, 중추신경계, 스테프스-존슨 증후군, 중독성피부 괴사증후군, ⑦ 기타, 장, 투여시, 만성간염, 급성골절, 이차성, 만성간염, 신장장애, ⑧ 과다투여, ⑨ 신장장애, 신근의 과다, ⑩ 이 약에 대해 사본 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같습니다. 발현빈도는 매우 흔히 >10, 흔히 >100 및 <10, 흔하지 않게 >10,000 및 <100, 드물게 >10,000 및 <10,000, 매우 드물게 <10,000 이다.

면역계 장애: 매우 드물게: 아세트아미노펜, 과민증
피부 및 피부과적반응: 매우 드물게: 두드러기, 소양성가려움증, 발진

표, 자발적 보고로부터 추정된 빈도에 따른 이 약의 사용후 경험에서 발견된 이상반응

⑨ 국내 부작용 보고자료의 분석평가에 따라 다음의 이상반응을 추가합니다.

⑩ 간장애: AST 상승, ALT 상승, ⑪ 피부: 고정발진

5. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

① 일반적주의

① 과민증상을 예측하기 위해 충분한 삼금을 받아야 합니다. ② 소염항염제 진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법증상별로 치료하는 방법입니다. ③ 만성성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다. 가. 장, 복통에는 경우 정기적인 임상검사요검사, 혈액검사, 간기능검사 등을 받고 이상이 있을 경우 검량조절, 복용중지 등의 적절한 조치를 해야 합니다. 나. 약물요법 이외의 치료법도 고려합니다. ④ 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다. 가. 급성통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용합니다. 나. 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용은 피합니다. 다. 원인요법이 있는 경우에는 실시합니다. ⑤ 소화 및 고령자노인은 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의합니다. 과다한 체중, 허혈, 사지장애 등이 나타날 수 있으므로 특히 고령을 수반하는 소아 및 고령자노인 또는 소양성 질환 환자의 경우, 복용 후의 상태를 충분히 살펴봅니다. ⑥ 다른 소염항염제와 함께 복용하는 것은 피합니다. ⑦ 의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상성인 또는 5일 이상소아에 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않습니다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화 될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의합니다. ⑧ 이 약 복용시 감염증을 일으킬 수 있으므로 감염증이 합병된 환자의 경우에 의사처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 합니다.

⑨ 과다투여시의 처치

이 약을 과량복용시 어떠한 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신속하게 의학적 처치 를 받아야 합니다. 10~12시간 이내에 N-아세틸시스테인 정맥주사를 투여하거나 메치오난을 경구복용하여 간을 보호해야 합니다.

저장상의 주의사항



【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

【포장단위】 10캡슐(10캡슐/PTP X 1), 30캡슐 (10캡슐/PTP X 3), 60캡슐/병, 120캡슐/병

【사용기간】 제조일로부터 24개월입니다.

제조사 : 코스맥스바이오(주) / 총복 제천시 바이오밸리3로 30

제조의뢰자 : (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고사소비자 분쟁해결기관에 의거 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

* 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.

* 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약물안전관리원(644-6223)

* 안전용기모양으로 포켓부분을 강하게 눌러 주십시오.



(주)대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14