

생약성분 염증치료제

마이산 캡슐

(배농산금당)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐(503 mg) 중

■ 유효성분

감초(KP) 0.50g

(이상의불건조엑스로서 405mg)

길경(KP) 0.67g

건강(KP) 0.17g

대추(KP) 0.50g

작약(KP) 0.50g

지삼(KP) 0.50g

■ 첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 4호, 황색 5호

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 캡슐

【성상】 알갈색의 분말이 충전된 상, 하부 미황색의 캡슐제

【효능·효과】 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(농음)성질환

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(출고 열리는 증상), 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성종기 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))
- 9) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 10) 이 약은 황색5호(선햄옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등 (1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (4) 소화기계 : 위부불쾌감 등
- 2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 10캡슐/상자(110캡슐/피티팩)X1)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조자】 경방산약(주) / 인천광역시 남동구 남동대로 394

【제조외의사】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2022.02.15) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2022년 02월 15일

40년 이상 엄마의 마음으로 여러분의 건강을 지켜온



(주)마더스제약 Since 1974 -
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO., LTD.