일반의약품

생약성분 염증치료제

마이산 캡슐
(배농산급탕)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐 중

■유효성분

감초(KP) ····· 0.50g
길경(KP) ····· 0.67g
건강(KP) ····· 0.17g
대추(KP) ····· 0.50g
작약(KP) ····· 0.50g
지실(KP) ····· 0.50g
(이상의물건조엑스로서 405mg)

■ 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색5호
■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 돼지, 가죽)
■ 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 콜로이드성이산화규소, 캡슐

【성상】 암갈색의 분말이 충진된 상,하부 암갈색의 캡슐제

【효능·효과】 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(곪음)성질환

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
   1) 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
   2) 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성종기 환자
   3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
   1) 고혈압 환자
   2) 심장애 또는 신장애(신장장애) 환자
   3) 부종(부기) 환자
   4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
   5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
   6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
   7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
   8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.).)
   9) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
   1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
      (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
      (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
      (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
      (4) 소화기계 : 위부불쾌감 등
   2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
   3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
   1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
   2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
   3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
   4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
5. 저장상의 주의사항
   1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
   2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
   3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 10캡슐/상자((10캡슐/피티피)X1)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부포장 참조

【제조자】 경방신약(주) / 충청남도 금산군 부리면 인삼약초공단로 27 (공정번호1~3)
경방신약(주) / 인천광역시 남동구 남동대로 394 (공정번호 4~9)

【제조의뢰자】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
※ 작성일자(2026.05.20) 이후 변경된 내용이나 자세한 품목허가 또는 신고사항은 본사(070-7457-8819)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2026년 05월 20일

(주)마더스제약
MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.