

근육경련 및 혈액순환 개선제

맥스원 플러스

(연질캡슐)

【원료약품 및 그분량】1캡슐(1,513mg)중 (내용물 1,135mg)

- 유효성분 : 토크페올아세테이트(KP) 500.0mg(비타민E로서 500IU)
- 산화마그네슘(KP) 250.0mg(마그네슘으로서 150.78mg)
- 벤포티아민(KP) 20.0mg(티아민염산염으로 14.46mg)
- 티아민질산염(KP) 35.0mg
- 셀레늄함유건조효모(KP) 37.0mg(셀레늄으로서 20μg)
- 감마오리자놀(KP) 5.0mg
- 첨가제(동물유래) : 백납(기원동물 : 꿀벌, 사용부위 : 알납), 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
- 첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호, 청색1호
- 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 정제수, 콩기름, 팜유

【효능·효과】

- 비타민 E 및 B1의 보급
- 육체피로, - 임신·수유기, - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시, - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 강변기시 다음 증상의 완화 : 어깨, 목경림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움), - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨경림 등), - 각기, - 눈의 피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자
- (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 안산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 임부

(8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당(아지)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 모·호흡기 악취, 탈모, 조급증
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- (5) 황달도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- (3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 60캡슐(10캡슐/PTP포장 X 6), 120캡슐(60캡슐/10캡슐/PTP포장 X 6) X 2EA

【제조의뢰자】 아이큐어(주) / 경기도 안성시 서운면 제3공단3길 13

【제조자】 동방에프티엘(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78

【판매자】 광동제약(주) / 서울 서초구 서초중앙로 85 가산빌딩

작성(개정)연월일: 2018.08.23

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 의약품용 사용하기 전에 첨부문서를 반드시 읽어주시시오. 또한 필요시 읽을 수 있도록 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (단, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)

※ 유효한 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

※ 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담전화 (080-700-0178) 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.