

칼리디놀정

칼리디노게나제



[원료약품의 분량] 이 약 1정중

- 유효성분(동물유래성분): 칼리디노게나제(돼지췌장)(JP) ... 50 I.U
- 첨가제(동물유래성분): 무수유당(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저지환도 하드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스프탈레이트

[성상]

흰색의 원형 장용성 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

[용법·용량]

1일 30-150 I.U를 3회 분할하여 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 과민증: 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 기타: 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

3. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

[포장단위] 30정/병, 100정/병, 500정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관

[제품문의처] 080-601-0080

-
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 - ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 - ※ 이 설명서 최종 개정연월일(2022.08.10) 이후 변경된 내용은 의약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인하실 수 있습니다.
 - ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (1644-6223 또는 14-3330)
-

[제조의회사] ㈜제뉴원사이언스
세종특별자치시 전의면 산단길 245

[제조자] ㈜일화
강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55