

DS

www.dongsung-pharm.com

일반의약품

분류번호 237

동성정로환[®]F 에프정

DS

동성 正露丸[®]에프정

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효 성분 : 구아아쿨(BP)	25.00mg
황백엑스산(생규)	40.60mg
(황백으로서 300.85mg)	
황련가루(생규)	12.50mg
감초가루(생규)	12.50mg
진피건조엑스(5→1)(별규)	8.40mg
(진피로서 42.00mg)	

■ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 포비돈, 메타규산알루미늄산마그네슘, 이산화규소, 크로스카르멜로스나트륨, 스테아르산마그네슘, 오파드라이클리어(O3K19229), 오파드라이클색(200 200F280000), 오파드라이클색(FX 62W28547)

[성상] 흰색~미백색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 설사, 체한, 묽은 변, 토사

[용법·용량] 1일 3회 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

만 15세 이상 및 성인: 1회 4정 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만: 1회 2정

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아
- (2) 투석요법을 받고 있는 환자
- (3) 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- (2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- (3) 신장(콩팥)질환의 병력이 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약을 복용하는 동안 드물게 식욕부진, 위부불쾌감 등이 나타나는 경우
- (2) 수일 간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- (3) 1주 이상 계속하여 복용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- (3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 36정(12정/PTP×3)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 부작용 보고 한국약품안전관리원(1644-6223)

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1903-00

첨부문서 최초 작성년월일 2019. 03. 28

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및 식품의약품안전처 홈페이지 의약품통합정보시스템 (http://nedrug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

[제조 및 판매자]  동성제약주식회사

[본사] 서울시 도봉구 도봉로 683

[공정] 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

[소비자 상담번호] 080-001-0921