

메가콘 600정

【원료약품 및 분량 : 1정(1,134mg) 중】

■ 유효성분

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
푸르셀티아민(KP)	50mg
니코틴아미드(KP)	50mg
이노시톨(KP)	25mg
폴리타르타르산염(별규)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
시아노코발라민 1000배산(KP)	10mg
(시아노코발라민으로서 10μg)	
피리독신염산염(KP)	10mg
리보플라빈(KP)	6mg
감마-오리자놀(KP)	5mg
콜레칼시페롤 과립(EP)	0.5mg
(콜레칼시페롤로서 50IU)	

■ 유효성분(동물유래성분) : 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 경질무수구산, 스테아르산 마그네슘, 히프로멜로오스, 탄실드 감색 91B749

【성상】 갈색의 장방형 펠름코팅정제

【효능 · 효과】

1. 다음경우의 비타민 D, B, B₆, B₁₂의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 - 발육기 - 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기 - 눈의 피로

【용법용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 잇몸 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

5) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구토, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 변비, 식욕부진, 흉만, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종, 부종 · 수분지류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애) 또는 병적발하이 나타날 수 있다.
- 3) 흡산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진 시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다).

5) 우발적으로 과량복용한 경우

6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
- 3) 이를 약으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30정/병, 30정/상지(10정/PTP×3), 45정/병, 60정/병, 60정/상지(10정/PTP×6), 90정/상지(45정/병×2), 90정/상지(10정/PTP×9), 120정/상지(60정/병×2), 120정/상지(10정/PTP×12)

※ 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국약물안전관선원(karp.drug safe.or.kr)의약품 부작용신고 및 피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제신청이 가능합니다. ※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부 문서의 개정일자(2023.07.24) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kbpharma.co.kr) 또는 의약품안전나라(http://nedrug.mfds.go.kr)를 통해 확인할 수 있음. ※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품 안전나라(http://nedrug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조 ※ 사용(유효) 기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

개정연월일 : 2023년 07월 24일

【제조자】 주식회사 노비엔헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지산산업로 16-53

【제조외지자】 (주)경보제약 종근당헬스케어 / 본사 · 공장 :

충청남도 아산시 실목로 174 / 서울사무소 : 서울특별시

서대문구 충정로 8

【소비자 상담실】 02-365-2312