

라파진정

(레보드로프로피진)

KGMP 전문의약품 분류번호: 222

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

■ 유효성분 : 레보드로프로피진(EP).....60.0mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침: 급·만성기관지염

[용법·용량] 성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

[포장단위] 30정/병, 300정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[제조사] 콜마파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

[판매자] (주)라온파마 서울특별시 영등포구 선유로9 유니온빌딩 304호

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

[문의전화] (주)라온파마 02)2069-0941

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질 검사를 필한 제품입니다. 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 본 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색'란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사



콜마파마(주)

판매자



최종개정연월일 : 2018.09.03