

이누신캡슐(은교산)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

· 유효성분 :

금연화(KP) 710mg	연교(KP) 710mg
두시(생규) 356mg	우방자(KP) 356mg
박하(KP) 426mg	갈경(KP) 426mg
감초(KP) 426mg	담죽엽(생규) 284mg
영양각(생규) 22mg(기원: 영양, 사용부위: 뱃)	
형개(KP) 284mg	이상 건조엑스로서 500mg

- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색1호
- 기타첨가제 : 콜로이드알실리콘디옥사이드, 스테아르산 마그네슘, 캡슐

[성상] 갈색의 분말이 충전된 상부 갈색, 하부 흰색의 경질캡슐제

[효능·효과] 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

[용법·용량] 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 5세 미만의 영(영아) · 유아
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
 - 1) 고혈압 환자
 - 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자
 - 3) 부종(부기) 환자
 - 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
 - 5) 위장이 허약한 환자
 - 6) 지금까지 약에 의해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 9) 고령자(노인): 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의하십시오.
 - 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하시고 상담 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론

증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.

(3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등

(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등

2) 수일만 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시키십시오.

4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루르게 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이티드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.

5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 율에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10캡슐/PTP

[제조자] 경진제약사 / 경기도 이천시 월면 일생로 406번길 6

[제조외곽지] 한국코러스(주) / 충청북도 제천시 감저로 30

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우 구입처를 통하여 교환하드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고,

어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 본 제품을 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 보고 및 피해구제를 문의하실 수 있습니다.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

작성연월일 : 2018.09.12

PK-62460-001