

엄마와 아기를 위한 천연색소 폴산(엽산)제

# 녹십자 폴산 정

폴산(엽산) 결핍증의  
예방 및 치료

일반의약품  
분류번호 313

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

## 【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 폴산(KP) ..... 1.0 mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 차지황색소, 포비돈

## 【성상】 노란색의 원형 정제

## 【효능·효과】

1. 폴산결핍증의 예방 및 치료
2. 폴산의 수요가 증가하여 식으로부터 섭취가 불충분한 경우의 보강  
소모성 질환, 임부·수유부
3. 악성빈혈의 보조요법(비타민 B<sub>12</sub> 결핍으로 인한 빈혈 제외)
4. 다음 질환 중 폴산의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우
  - 1) 영양결핍성빈혈, 임신성빈혈, 소아빈혈
  - 2) 항전도(간질)제 투여로 인한 빈혈
  5. 알코올중독 및 간질환에 관련된 거대적아구성빈혈

## 【용법·용량】

1. 폴산결핍증, 다른 약물 투여로 인한 결핍증 치료  
성인 및 24개월 이상 소아 : 폴산으로서 1일 0.25~1 mg를 복용합니다.
2. 폴산결핍증 예방 및 폴산의 요구량이 증가하는 각종 질환  
성인 및 24개월 이상 소아 : 이 약으로서 1일 0.1~0.25 mg를 복용합니다.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
  - 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
  - 2) 비타민 B<sub>12</sub> 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈 환자
  - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 악성빈혈 환자(투여 시, 혈액상태는 개선되나 신경증상에는 효과가 없으므로 비타민 B<sub>12</sub> 제제를 병용(함께 복용)합니다. 단, 진단이 확립되지 않는 악성빈혈 환자의 경우 혈액 상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하여 진단 및 치료에 영향을 줄 수 있으므로 주의합니다.)

3) 아마노살리산산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(억제제)(메트토크세이트, 트리메토프림 등)를 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 초래할 수 있습니다.)

4) 페니토인 같은 하단토인계 항전도(간질)제를 복용 중인 환자(페니토인의 혈중농도를 감소시켜 발작빈도를 증가시킬 수 있습니다.)

5) 설파살라진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자(이 약의 위장관 흡수를 저해할 수 있습니다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 홍반(붉은 반점), 피부발진, 가려움증, 전신근통, 호흡곤란 등의 알레르기 증상

2) 식욕부진, 구역·구토, 부종(부기), 체중감소

3) 위장관장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력 장애 등의 중추신경 장애(고용량(1일 15 mg 이상)에서 나타날 수 있습니다.)

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.

2) 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오.

3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.

3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【포장단위】 30정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【제조사】 (주)마더스제약 경성북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2018년 9월 7일) 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.greencross.com](http://www.greencross.com))나 소비자 상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조의뢰 및 판매자



GC 녹십자

(주)녹십자

충북 음성군 금왕읍 무극로65번길 26

Tel. 031)260-3300 소비자상담실 Tel. 080-260-0033

[www.greencross.com](http://www.greencross.com)

설명-10-1017-1