

일반의약품

요 신 정

우수의약품제조

K G M P

적격업체제품

【제품명】요신정

【원료약품 및 그 분량】1정(300mg) 중

■ 유효성분

지황(KP)	416.7mg	치자(KP)	125mg
당귀(KP)	416.7mg	용담(KP)	125mg
목통(KP)	416.7mg	육계(KP)	16.7mg
황금(KP)	250mg	생강(생규)	16.7mg
택사(KP)	250mg	대황(KP)	16.7mg
차전자(KP)	250mg	마황(KP)	16.7mg
감초(KP)	125mg	연교(KP)	16.7mg
		이상수침건조엑스로서	200mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소·우유)

■ 기타첨가제 : 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜600

【성상】 황갈색의 원형 필름코팅정

【효능효과】 방광카타르, 요도염, 신장(콩팥)병, 신증(콩팥증)후군, 부종(부기)

【포장단위】 20정

【용법용량】 보통 성인 1회 3~6정, 7~14세 2~3정을 1일 2회(아침, 저녁) 복용한다.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 6세 이하의 어린이
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.)
- 3) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 4) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 설사유도약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 5) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 6) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 7) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 8) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 9) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 10) 고령자(노인)(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의할 것.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 약사에게 상담할 것
- (2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론 증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (4) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- (5) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 특히 주의할 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 3) 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 4) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
- 5) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제(무로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 6) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것. 대황 함유제제는 특히 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

Kyoungbang

경방신약주식회사

인천광역시 남동구 남동대로334(남동동, 남동공단 338/81)

소비자상담실 : 032.822.4322

http://www.kbpharm.com

설명서 개정년월일 : 2018.09.27

1809(ver.01)

※ 자세한 사항은 식품의약품 안전처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.