

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.



인후프신 캡슐(은교산)

일반의약품
분류번호 1 1 4
KGMP 직판업체

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

■ 유효성분	
금은핵(KP)	710 mg
연교(KP)	710 mg
박하(KP)	426 mg
길경(KP)	426 mg
감초(KP)	426 mg
담죽연(생규)	284 mg
형개(KP)	284 mg
두시(생규)	356 mg
우방자(KP)	356 mg
염암자(생규)	22 mg
이상 건조엑스로서	490 mg

- 첨가제(타르색소) : 황색 4호, 황색 5호, 황색 203호, 청색 1호
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 콜로이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】 갈색의 가루가 충전된 상 녹색불투명 · 하 미황색불투명의 경질캡슐제

【효능 · 효과】 감기로 인한 목구멍 통증, 목아름, 기침, 두통

【용법 · 용량】

보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전(식사때와 식사때 사이)에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 5세 미만의 영(젖)아 · 유아
- 2) 이 약은 유당(젖당수화물)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병 또는 신장에(신장(콩팥)장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
- 5) 위장이 허약한 환자
- 6) 지금까지 약에 의해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 8) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 9) 고령자(노인) 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의하십시오.)
- 10) 이 약은 황색 4호(타르)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
- 11) 이 약은 황색 5호(설탕)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는

환자에는 신중히 투여합니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 니트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
 - (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - (3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
 - (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시키십시오.
- 4) 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로로메타이드)와 병용(함께 복용(사용)) 시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐

【제조회자】 에이프코젠제약㈜ / 경기도 화성시 양감면 두어리길 16

【제조지】 정우신약㈜ / 충청남도 아산시 신창면 서부남로 790번길 60

【판매지】 ㈜대우생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 09월 15일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2018.09.15
관리번호 : 1809-00