

리카바

연질캡슐

간기능개선 · 만성간질환 · 육체피로



[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

■ 유효성분

우르소데옥시콜산(UDCA)(KP)	50mg
티아민질산염(비타민B1)(KP)	10mg
리보플라빈(비타민B2)(KP)	5mg

■ 첨가제(타르색소): 청색 1호, 적색 40호

■ 기타 첨가제: 공기름, 팜유, 백당, 레시틴, 숙신산젤라틴, 농글리세린, 소르비톨액(비결정성), 이틸바닐린, 산화티탄

[성상] 황색의 내용물을 함유하는 적색의 타원형 연질캡슐제



[효능·효과]

- 만성 간질환의 간기능 개선
- 간기능 장애에 의한 다음 증상의 개선 : 육체피로, 전신권태

[용법·용량] 성인: 1회 1캡슐, 1일 3회 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 전격성(급격히 발병하는) 간염 환자
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 소아(동물실험에서 태아독성이 보고되어 있습니다)
 - 크론병과 같은 대장 및 소장염 환자
 - 방사선비투과성 석회화된 담석 환자
 - 비기능성 담낭(쓸개) 환자, 급성 담낭(쓸개)염 환자
 - 신(콩팥)질환 환자
 - 소화성궤양(급성 위 · 십이지장 궤양) 환자(점막자극작용이 있으므로, 증상을 악화시킬 수 있습니다)
 - 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 다음 의약품의 작용이 증강될 위험성이 있습니다: 경구(먹는)용 당뇨병용제(톨부타미드)
 - 다음의 약물은 이 약의 흡수를 방해합니다: 콜레스티라민, 콜레스티폴, 약용탄, 마그네슘 및 수산화알루미늄을 함유하는 제산제
 - 담즙(쓸개즙)에서 콜레스테롤을 감소시키는 약물(예, 에스트로겐 함유 경구(먹는)용 피임제) 또는 혈액의 콜레스테롤을 감소시키는 약물(예, 콜로피프레트)
 - 간에 손상을 주는 약물과 병용(함께 복용(사용))을 피합니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 심한 췌장(이자)질환 환자
 - 담석증 환자
 - 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

 - 소화기계: 설사, 구역, 구토, 배아름, 변비, 가슴앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타나는 경우
 - 과민반응: 가려움, 발진 등이 나타나는 경우

- 3) 기타: 전신권태감, 어지럼, 담석의 석회화, 간효소치의 증가(ALT, ALP, AST, γ -GT), 백혈구 감소가 나타나는 경우
- 4) 간질성 폐렴·발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상을 동반한 간질성 폐렴이 나타나는 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 2) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 합니다. 환자가 다른 경주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오염(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[사용기한] 외부포장에 표기

[포장단위] 90캡슐, 180캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

- ※ 연질캡슐이 녹거나 변형 및 변색될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오.
- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2018년 9월 4일



제조의회·판매자

유현양행

본사: 서울특별시 동작구 노량진로 74
 공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219

소비자상담실: 080-024-1188

홈페이지: www.yuhan.co.kr

제조사 (주)서홍 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61