

일반 의약품

분류번호:238

효과빠른 변비약

리치 정 300정



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

수산화마그네슘(KP)	500mg
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
노화엑스(EP)	100mg
(히드록시안트라센유도체로서 20.0mg)	
판토텐산칼슘(KP)	10mg
기타첨가제: 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스	

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과] 변비

· 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진·식욕감퇴, 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량] · 만5세 이상 및 성인: 1회 1정 1일 3회 식전·식간 또는 식후에 복용한다.

· 만 1세 이상 ~ 만 5세 미만: 1회 1정 1일 2회 아침, 저녁 공복시·식전 또는 식간에 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 급성 복부(배부분)질환(홍수·맹장고리염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색·창자막힘 환자

3) 만 7세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역·구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 신장장애 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어질 가려운 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 복부(배부분) 불쾌감, 경련이 일어날 경우 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한내성

이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것 3) 오용(잘못

사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 300정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 밀폐용기 실온(1~30℃)[주와-이상반응]

[소비자상담실] 02-521-2308, www.mirae-pharmkorea.co.kr

* 본 제형은 일정한 품질관리를 위한 제형입니다. 만약 유통과정 중 변색, 또는 오손된 제형이 발견될 경우에는 구입처 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 이 약은 약 0.04% (1%) 차등도량에 의하여 변색된 내용 및 기타 자세한 약제정보는 홈페이지 또는 <http://www.mirae-pharmkorea.co.kr> <고객문의> <112> (내선)에서 확인하실 수 있습니다.

* 부작용신고: 한국약사협회(02-6949-6000)

Rev.01

제조사:



제조번호:

69mm X 14mm

사용기한: