

Red river

하루 한 알 고향량 간장 보조제

레드리버 연질 캡슐

밀크시슬엑스 350mg

KGMP적격업체 | 일반의약품 | 분류번호 03910



일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 내용을 확인하세요.

[유효성분] 이 약 1캡슐(1,150mg) 중

밀크시슬엑스(생규) 350.0 mg

[효능·효과] 다음 질환의 보조치료 ■ 독성간질환 ■ 만성간염 ■ 간경변

[용법·용량] 1일1회, 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 심한 담도(쓸개관) 폐쇄 환자
 - 이 약의 과민증 환자
 - 12세 이하의 소아
 - 대두유에 과민하거나 말레르기 병력이 있는 환자
 - 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것
 - 임신, 수유부
 - 고지단백혈종, 당뇨병성고지질혈증 및 폐경(미자)증 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 드물게 위통 또는 설사
 - 알레르기 반응
- 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 경해진 용법·용량을 지킬 것
 - 항달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용 시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 지혈과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈관지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주요 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 60캡슐/TPX3개

[사용기한] 아래 표시일까지

[참가제]

- 참가제(타르색소): 적색40호, 청색1호
- 참가제(동등유래성분): 젤라틴(기원동물: 소, 돼지, 사용부위: 가죽)
- 기타참가제: 공기름, 아자경화유, 황산, 레시틴, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 에틸버닐린, 산화티탄

[성상]

황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

■ 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설회에 한하여 교환하여 드리오나 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드립니다. 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 책임공공 품질경영본부(전화:080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

제조회 및 판매원

제일헬스사이언스주식회사 경기도 용인시 처인구 백암면 청강차로 7 B동

제조원

코스맥스바이오㈜ 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

설명서작성년월일 2018.12.05



제일 헬스 사이언스