

미카펜정(MICAPHEN Tab.)

일반의약품

분류번호:114



※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

*유효성분 : 에페드린염산염 (KP)	25.0mg
카페인무수물 (KP)	25.0mg
아세트아미노펜 (KP)	200.0mg

*기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산 나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 감기의 증상(여러증상)(인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오히려
출고 떨어지는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용
한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열
진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는
사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식
을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을
복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하
는 내복약(비염용 경구제, 멸미약, 알레르기용약)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제
품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상
을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함
께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사 와 상의할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및
만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있
다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으
므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경
우도 만 2세 미만의 영유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필
요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미
만 영유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊
게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식,
알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체
질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가
려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십
이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이
있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나
궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관
절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는

사람)

- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1
주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열발진이나 지속적
인 두통이 동반되는 기침(항히스타민제, 진해제, 거담제 함유제제)
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약
사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진, 발적, 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종, 어지러움, 불
안, 떨림, 불면
2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스) : 복용 후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등
과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함
등이 나타날 수 있다.
② 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용
해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진, 발적, 화상과 같이 물
집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나
타날 수 있다.
③ 천식
④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색
을 띄게 됨)이 나타날 수 있다.
⑤ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등
이 나타난다.
3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것.
2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
3) 복용시에는 음주하지 말 것.
4) 비르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다
량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노
펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보
관할 것.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지
말 것.

[포장단위] 60정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)씨트리 / 경기도 남양주시 경강로 27

- ※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를
의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필
한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질변패 또는
오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환
하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또
는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관
(<http://drug.mids.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.
- ※ 기타 자세한 사항이나 문의의 작성일자(2018. 10. 22) 이후 변경된 내
용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

C-TRI 코스닥상장법인
(주)씨트리