

가네존 연질캡슐(밀크시슬열매건조엑스)

Milk thistle fruit dry extract 350mg



■ 원료약품 및 분량: 1캡슐 중

- 유효성분: 밀크시슬열매건조엑스(실리마린으로서 196mg)(생규) - 350mg
- 첨가제(디트랙소): 착색40호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소/돼지, 가족내피)
- 기타 첨가제: 콩기름, 아자정화유, 황산, 레시틴, 폴리소르베이트80, 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 에틸바닐린, 산화티탄

■ 성상: 황갈색의 유상 내용물을 함유한 암색의 장방형 연질캡슐

■ 효능·효과: 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

■ 용법·용량: 1일 1회, 1회 1캡슐

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 이 약의 과민증 환자
- 12세 이하의 소아
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 임신, 수유부
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상담할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 드물게 위통 또는 설사
- 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 장해진 용법·용량을 지킬 것
- 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정수용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하고 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간: 제조일로부터 24개월

■ 포장단위: 60캡슐/PTP, 120캡슐/PTP

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 02-3487-7005로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어아하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품검색에서 확인할 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정일: 2018년 11월 27일

■ 제조자: 코엑스바이오(주) 충북 제천시 바이오밸리3로 30

■ 제조의뢰자: (주)이투피마 충북 진천군 문백면 농나리1로 1149

■ 판매자: (주)대웅생명과학 서울특별시 송파구 잠실로 42