

엘도투 캡슐 300밀리그램 (에르도스테인)

일반의약품 조제용

Erdosteine

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(401 mg) 중

- 유효성분 : 에르도스테인(별규) 300 mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈, 캡슐

【성 상】

흰색의 분말이 들어있는 상부 초록색, 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능·효과】

급·만성 호흡기질환에서의 점액응해 및 거담

【용법·용량】

성인: 에르도스테인으로서 1회 300 mg을 1일 2~3회 경구투여(복용)한다.
급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자(이 약의 대사물이 메티오닌 대사를 방해할 수 있다.)
- 소화성궤양 환자
- 중증 신장장애(크레아티닌청소율이<25 mL/min) 환자
- 중증 간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 경증 및 중등도 간장애 환자(이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300 mg을 초과해서는 안 된다.)
- 당뇨병 환자 및 저칼로리식이요법 중인 환자(시럽제에 한함)
- 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이상반응

- 사용량보다 과량투여(1일 1200 mg이상)시 발한, 어지러움, 홍조가 나타났다.
- 신경계 : 두통
- 호흡기계 : 감기, 호흡곤란
- 소화기계 : 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통, 속쓰림
- 피부 : 두드러기, 홍반(붉은 반점), 습진
- 국내 시판 후 조사결과(조사종례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진, 얼굴부종, 전신부종, 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진

4. 상호작용

거담제는 기침약과 병용투여 시 기침 완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지연축을 야기할 수 있으므로 특히 주의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 수태, 태자의 배아발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 직·간접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【포장단위】

30캡슐/병, 100캡슐/병, 300캡슐/병

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】

제조일로부터 36개월

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질,변패, 오손된 제품인 경우 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2022년 3월 28일)이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.intropharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마시고, 의약품을 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 바랍니다.

ETC1220328

【제조사】

코스맥스파마(주)

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

【판매자】

(주)로하스메디

충청남도 아산시 배방읍 회망로 46번길 45-19