일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 제품관련정보를 확인하십시오.

[유효성분] 이 약 1정 중

메타규산알루민산마그네슘(KP) ((건조물이며)산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)	40.0mg
탄산수소나트륨(KP)	50.0mg
디아스타제·프로테아제·셀룰라제(별규) (전분당화력(pH4.5) 278단위, 단백소화력(pH3.0) 170단위)	20.0mg
스코폴리아엑스(KP) (총알칼로이드[히요스아민(C17H23NO3:289.37 및 스코폴라민(C17H21NO4:303.35)]로서 50㎍)	5.0mg
리파제(별규) (지방소화력(pH6.0) 45단위)	7.5mg
겁초가루(생규)	25.0mg
(글리시리진산으로서 0.63mg) 침강탄산칼슘(KP)	100.0mg
트리메부틴말레산염(KP)	50.0mg

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량]

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움등)을 일으킨 일이 있는 환자 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자 3) 신장애(신장장애) 환자 4) 간장애 환자 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자 3) 부종(부기)이 있는 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본적의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것. 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 체제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기 측면 표시일까지

[첨가제]

· **첨가제(타르색소)** : 황색203호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크, 황색4호알루미늄레이크
· **첨가제(동물유래성분)** : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위: 유유)
· **기타 첨가제** : 백하유, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 그린 03B610039, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈

일반의약품 정보(계속됨)

7. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

8. 상호작용 : 위장진통, 진경제(경련완화제)와 병용 투여하지 않는다.

9. 소아·임부에 대한 투여 : 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다. 2) 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항 : 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[성상] 녹색의 원형 필름코팅정제 **[포장단위]** 12정(2정/포x6), 480정(2정/포x240) ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 의약품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)의 '의약품등 제품정보'란을 통해 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품을 사용하기 전에 제품관련정보를 주의 깊게 읽으시고, 제품관련정보를 함께 보관하시기 바랍니다. ※부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223) ※제품문의처 : 080-920-2002(동아제약(주) 고객만족팀) ※최종개정연월일 : 2020.10.14

[일부공정위탁제조(제조의뢰자)] 콜마파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

[일부공정위탁제조(제조자)] (주)마더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

[판매자] 동아제약(주) 서울특별시 동대문구 천호대로64

[제조번호]

[사용기한]

착인공간 : 45x20
인쇄X 코팅X

201014 SIC240-20K001

8 806980 041338