

생약성분

로니셀정(은교산)

기침·목구멍 통증·목마름·두통

일반의약품



[원료약품 및 그 분량] 1정(650mg) 중

■ 유효성분 :

금은화(KP)	710,0mg
연교(KP)	710,0mg
박하(KP)	426,0mg
길경(KP)	426,0mg
감초(KP)	426,0mg
담죽엽(생규)	284,0mg
형개(KP)	284,0mg
두시(생규)	356,0mg
우방자(KP)	356,0mg
영양각(생규)	22,0mg

이상 건조엑스로서 500mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소,우유)

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소, 탭실드칼색(99B722), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 정방형 필름코팅정

[효능·효과] 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

[용법·용량] 보통 성인 1회 2정, 7~14세 1정을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

5세 미만의 영·유아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
- 5) 위장이 허약한 환자
- 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 10) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류, 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 5) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정(10정/PTP x 1ea)

[설명서 개정연월일/관리번호] 2025.04.18/P2504-01

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자분쟁해결기준”에 의거, 상당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 최종 개정연월일(2025.04.18)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 합니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223 혹은14-3330)

[판매자]



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

홈페이지 www.ilyang.co.kr

[제조사]



KYUNGBANG

경방신약

인천광역시 남동구 남동대로 394

충청남도 금산군 부리면 인심약초공단로27

<https://www.kbpharm.com>