

고함량 콘드로이틴 600mg + 활성비타민 B 복합제

제일콘드로 600정

콘드로이틴600mg

[원료약품 및 그 분량] 1정(1,134mg) 중

■ 유효성분 : X - 오리자놀(KP)	5 mg
푸르셀티아민(KP)	60 mg
니코틴산아미드(KP)	60 mg
폴리타르타르산염(USP)	20 mg
판토텐산칼슘(KP)	15 mg
(칼슘으로서 1.2 mg)	
리보플라빈부티레이트(KP)	6 mg
이노시톨(KP)	20 mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600 mg
피리독신염산염(KP)	25 mg
시아노코발라민 1000 배산(KP)	20 mg
(시아노코발라민으로서 20ug)	

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

■ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산, 이소프레이적색(GMIEKR26B), 히프르멜로로스

[성상] 갈색의 강방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

■ 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)

■ 각기, 눈의피로

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12 개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자
- (6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- (1) 만 1 세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

(4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

(5) 심장·순환기계기능 장애 환자

(6) 신장장애 환자

(7) 저단백혈증 환자

(8) 강상배당체를 투여 중인 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 붉은 변, 설사, 구내염(임안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요 산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- (7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (일폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

[포장단위] 90정(45정/병X2EA)

[제조외 및 판매원] 제일헬스사이언스주식회사 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

[제조원] (주)머더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

설명서작성년월일 2018.12.05

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅팀(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화:080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilhs.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



제일헬스사이언스