

마투탑 플러스

Matutop plus.

【제품명】마투탑 플러스

【원료약품 및 그 분량】1캡슐(1.65 mg) 중

■ 유효성분 :

토코페롤아세테이트(KP)	500.0 mg
(비타민E로서 500 IU)	
신화마그네슘(KP)	250.0 mg
(마그네슘으로서 150.78 mg)	
피리독산염산염(USP)	52.0 mg
티아민질산염(KP)	50.0 mg
감미오리자놀(KP)	5.0 mg

■ 첨가제 :

착색제(타르색소) : 적색 40호, 황색 5호, 청색 1호
공기질, 황랍, 레시틴, 폴리소르베이트80, 속산산젤라틴, 농글리세린, 산화티탄

【성상】회백색의 유상 내용물을 함유한 임갈색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B₆, B₁₂의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족중증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(오허리)통, 어깨결림 등, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기, 눈의 피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 2캡슐 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자
- (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구약, 복용하는 용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장(콩팥)장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 임부
- (7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당이제염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단하거나 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구약, 복용하는 용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전혈관 막힘증의 위험이 증가될 수 있다.

(4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

(5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

(6) 항알도스테론제, 트리아멘데인과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

(7) 우발적으로 과량 복용한 경우

(8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.
- (3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 24개월

【포장단위】60캡슐(10캡슐/PTP×6), 120캡슐(10캡슐/PTP×12)

【소비자상담실】080-6776-080(수신자부담)

【판매원】㈜조신당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가)

공장 : 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

【제조자】코스맥스바이오㈜ COSMAX BIO

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 개정일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

개정일자 : 2019. 02. 22