



호흡기질환 치료제

엘디오스 캡슐

(에르도스테인)

[원료약품의 분량] 이 약 (427.0mg) 중

• 유효성분 : 에르도스테인(결구) 300.0mg

[효능·효과]

급·만성호흡기 질환에서의 점액유해 및 거담

[용법·용량]

성인 : 에르도스테인으로서 1회 300mg을 1일 2~3회 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)
급성 호흡기질환에 투여 시 연속으로 10일 이상 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 간경변 환자와 시스타티오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자 (이 약의 대사물이 메티오닌 대사를 방해할 수 있다.)
- 3) 소화성궤양 환자
- 4) 중증(심한 증상)의 신장(콩팥)장애(크레아티닌청소율이 25 mL/min) 환자
- 5) 중증(심한 증상)의 간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

경증(경증상, 가벼운 증상) 및 중증도 간장애 환자(이 약으로 인한 이상반응의 증가는 관찰되지 않았으나 이 약으로서 1일 300mg을 초과해서는 안 된다.)

3. 이상반응

- 1) 사용량보다 과량투여(1일 1200mg이상)시 발한(땀남), 어지러움, 홍조가 나타났다.
- 2) 신경계 : 두통
- 3) 호흡기계 : 감기, 호흡곤란
- 4) 소화기계 : 미각이상, 구역, 구토, 설사, 상복부통, 복통(배앓음), 속쓰림
- 5) 피부 : 두드러기, 홍반(붉은 반점), 습진
- 6) 국내 시판 후 조사결과(조사종례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통(배앓음), 위장장애, 설사, 구토, 두통, 신물이 올라옴, 결절홍반, 심계항진(두근거림), 얼굴부종(부기), 전신부종(부기), 가려움, 무력감, 몽롱함, 발진

4. 상호작용

거담제(가래약)는 기침약과 병용(함께 복용(사용))투여 시 기침완화에 의한 기관지 내 가래 배출 곤란으로 기관지감염의 위험을 높일 수 있고 기관지 연속(뒤따감, 수축)을 야기할 수 있으므로 특히 주의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 수태, 태자의 배자발육과 또는 산후 발육에 대해서 어떤 직·간접적 유독성은 발견되지 않았으나 임신 중 또는 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30캡슐/병, 300캡슐/병

[첨가제]

- 첨가제(타르색소) : 청색(호, 황색)203호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 상·하부 연녹색 경질캡슐, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜 산나트륨, 탈크, 포비돈

[성상] 흰색의 분말이 들어있는 상·하부 연녹색의 경질캡슐제

- 본 제품을 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. (구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.
- 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 031-319-1975로 문의하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223) ※ 첨부문서 개정연월일 : 2019. 02. 21

제조사



크리스탈생명과학

충청북도 청주시 흥덕구 2동 205-1 오송생명로 70

제조의자



동인당제약주식회사

경기도 서울특별시 강남구 테헤란로 59

www.dongindang.co.kr