

진해거담제

# 알피레드정

레보드로프로핀진

[원료약품 및 그 분량] 1정(250mg) 중

- 유효성분: 레보드로프로핀진(EP) 60.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

[성상] 흰색의 원형정제

[효능·효과] 다음 질환에서의 기침: 급·만성기관지염

[용법·용량] 성인: 레보드로프로핀진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.  
증상에 따라 적절한 증감한다.

[사용상의 주의사항]

## 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

## 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

## 3. 이상반응

- 1) 소화기계: 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계: 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계: 심계항진
- 4) 피부: 매우 드물게 알레르기 반응

## 4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

## 5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

## 6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

## 7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

[포장단위] 30정/병, 300정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[소비자상담실] 02-2002-9715

[제조회사] ㈜알피바이오 (경기도 화성시 향남읍 제곡공단4길 35-7)

[제조원] 콜마파마(주) (충청북도 제천시 바이오밸리2로 93)

- ※ 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 사용기한 또는 유효기간이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의하십시오.
- ※ 의약품용 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주십시오.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

설명서 작성일자: 2019.01.10

위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다

[제조회사]



(주)알피바이오

[제조원]



콜마파마(주)