

일반의약품

조제용

카르닐정

엘카르니틴

90정

※ 본 제품은 인습성이 강하므로 PTP상태로 조제하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 엘카르니틴(USP)..... 330mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 화이트(OY-C-7000A), 오파드라이 AMB 화이트(80W68912), 아크릴리즈 MP 화이트(93018508), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈

【성상】 흰색의 원형필름코팅정

【용법·용량】

성인 : 엘-카르니틴으로서 1일 2~3g을 2~3회 분할 경구 투여한다(먹는다, 복용한다).

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【효능·효과】

1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색

분류번호 : 219

※ 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 작성일자(2019년 03월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.intropharm.com)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 자세한 품목 허가 사항은 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참고하시기 바랍니다.

제조사 : (주)인트로바이오파마 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12

제 조 자 : (주)씨트리 경기도 남양주시 경강로 27

판 매 자 : (주)로하스메디 충남 아산시 배방읍 회창로 46번길 19-3

CARNIL Tab.

L-Carnitine

90 Tab.

※ 본 제품은 인습성이 강하므로 PTP상태로 조제하여 주시기 바랍니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 이 약에 과민증 환자
2. 부작용
일시적인 구역·구토, 복통(배앓), 설사, 체취가 나타날 수 있다.
이 약을 복용한 환자에게서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다.
이 약을 복용한 요독증 환자에게서 경증의 근육력증이 보고되었다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유 중에는 신중히 투여한다.

【저장방법】

기밀유기, 실온(1~30℃)보관



(01)08800524009112
PBC09T90 E01

제조번호 :

사용기한 :

40 × 20mm