

효과빠른 종합소화제 제스쿨 정

[조제용] 일반의약품

1000정

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(별규) 175mg
(전분당화력 92단위 이상, 지방소화력 52단위 이상, 단백소화력 3380단위 이상)
- 우담즙엑스(생규) 25mg
(콜산으로서 11,25mg)
- 디메티콘(NF) 25mg
- 셀룰라제(별규) 50mg
(섬유소당화력 5단위 이상)
- 첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 황색4호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 주성분(동물유래) : 판크레아틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 췌장), 우담즙엑스(기원동물 : 소, 사용부위 : 담즙)
- 기타 첨가제 : 건조수산화알루미늄겔, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스프탈레이트, 폴리에틸렌글리콜400, 산화티탄, 탈크, 디아세틸화노글리세리드

[성상] 연녹색의 장방형 장용성 필름코팅정제

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체한, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상 : 1회 2정 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 3) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. : 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 : 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, “소비자 피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

※ 문안작성일 : 2019. 02. 07 (Rev. 0)



[제조의회 및 판매자]

주 CMG 제약

경기도 서울시 공단1대로27번길 27

[제조사]



(주)마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로23길 18



(01)08806486037323

제조번호 :

사용기한 :

35*12mm 인쇄시삭제



HDPE
두께: LDPE