

젤리프 처방정 300mg

(프레가발린)

【원료약품의 분류】 이 약 1정 중

젤리프처방정150밀리그램

・유효성분：프레가발린(Pregabalin)(EP)----- 150mg
・첨가제：부틸히드록시톨루엔, 산화티탄, 스테아릴무마리스나트륨, 전호화천분, 카르나우바납, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 폴리에틸렌옥사이드, 히프록셀로스, D-만니톨

젤리프처방정300밀리그램

・유효성분：프레가발린(Pregabalin)(EP)----- 300mg
・첨가제：부틸히드록시톨루엔, 산화티탄, 스테아릴무마리스나트륨, 전호화천분, 카르나우바납, 탈크, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜6000, 폴리에틸렌옥사이드, 히프록셀로스, D-만니톨

【상성】

・젤리프처방정150밀리그램：흰색 내지 미황색 장방형의 필름코팅된 서방성 삼중정제
・젤리프처방정300밀리그램：흰색 내지 미황색 장방형의 필름코팅된 서방성 삼중정제

【효능·효과】

성인에서 말초 신경병증성 통증의 치료

【용법·용량】

- 이 약은 1일 1회 저녁 식사 후 투여한다. 이 약은 통째로 삼켜야 하며, 쪼개거나 으개거나 씹어서는 안 된다.
성인：
이 약은 시작용량으로 1일 150mg 을 투여할 수 있다. 개개 환자에서의 반응과 내약성에 근거하여, 일주일 간격으로 1일 최대 600mg 까지 증량할 수 있다.
투여의 중단：
현재의 임상적 경험에 따르면, 이 약의 투여를 중단할 경우, 적어도주일 이상의 간격을 두고 점진적으로 중단하여야 한다.
- 신기능 장애환자
이 약은 신기능 장애환자에서의 안전성과 유효성이 확립되지 않았다.
- 간기능 장애환자
이 약은 간기능 장애환자에서의 안전성과 유효성이 확립되지 않았다.
- 소아 및 청소년 환자
이 약은 만 19세 미만 소아 및 청소년 환자에서의 안전성과 유효성이 확립되지 않았다.
- 고령자 (만 65세 이상)
이 약은 만 65세 이상의 고령자에서의 안전성과 유효성이 확립되지 않았다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 자살충동과 자살행동
(1) 항간질약을 복용한 환자에서 자살충동 또는 자살행동을 보이는 위험성이 증가되므로 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화에 대하여 모니터링되어야 한다.
(2) 항간질약을 처방받는 간질환과 다른 질병은 그 자체가 이환 및 사망, 치료기간 동안의 자살충동과 자살행동의 위험성증가와 관련된다. 따라서 처방자는 항간질약 처방 시 환자의 치료기간 동안 자살충동 또는 자살행동과 치료될 질병간의 연관성 유무 및 이 약의 유효성을 함께 고려한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

① 프레가발린 또는 이 약의 성분에 과민한 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 당뇨환자：최근 프레가발린의 투여로 체중이 증가된 당뇨환자는 혈당강화제의 용량 조정이 필요할 수 있다.
- 프레가발린 속방캡슐의 시판 후 경험에서 혈관부종을 포함한 과민반응이 보고된 바 있다. 안면, 입주위 및 상기도 부종과 같은 혈관부종의 증상이 나타난 경우에는 즉시 프레가발린을 중단해야 한다.
- 고령자：프레가발린의 투여는 고령의 환자에서 우연한 상해의 빈도를 증가시킬 수 있는 여러종류 및 출혈과 연관되었다. 프레가발린 속방캡슐의 시판 후 조사에서 의식 소실, 혼돈, 정신 장애가 보고된 바 있다. 따라서 이 약의 잠재적인 효과에 익숙해질 때까지 주의하도록 환자에게 주지 시켜야 한다.
- 프레가발린 속방캡슐의 시판 후 경험에서, 프레가발린을 투여한 환자에서 일시적 시야흐림과 시력의 다른 변화가 보고되었다. 프레가발린의 중단으로 이러한 증상이 사라지거나 개선될 수 있다.
- 프레가발린을 보조제로서 투여하여 발작을 조절한 후 프레가발린을 단독요법으로 투여하기 위해 병용중인 항간질약을 중단한 경우에 대한 자료는 충분치 않다.
- 프레가발린 속방캡슐을 단기간 또는 장기간 치료하다 중단한 후에, 일부 환자에서 불면증, 두통, 구역, 불안, 설사, 인플루엔자유사증후군, 관절부절, 우울, 통풍, 발작, 다한증 및 어지러움과 같은 급단 증상이 관찰되었다.
- 프레가발린은 약물 남용과 관련된 사용법에 적용한다고 알려져 있지 않다. 하지만 시판 후 자료에서 오용 및 남용 사례들이 보고되었다. 다른 모든 CNS 활성 약물과 마찬가지로, 환자들의 약물 남용 행위를 주의 깊게 검토하고 그들의 프레가발린 오용 및 남용 징후에, 내성의 발전, 투여용량 증량, 약물추구 행위를 관찰해야 한다.
- 신기능 장애에 대한 약물 중단의 효과가 체계적으로 연구된 바는 없으나, 프레가발린의 중단이나 용량 감소 후에 신기능이 개선되었다는 보고가 있었다.
- 프레가발린 노출과 월경성 심부전 사이에 인과 관계가 확인된 바는 없으나, 시판 후 조사에서 프레가발린을 투여한 일부 환자의 월경성심부전이 보고된 바 있다. 임상적으로 유의한 심장 또는 말초혈관 질환이 없는 환자에 대한 단기 시험에 의하면, 고혈압이나 월경성심부전 같은 심혈관계 합병증과 말초성 부종 사이에 명백한 관련이 나타나지 않았다. 중증의 월경성심부전 환자에 대한 자료가 충분치 않으므로 이러한 환자들에게는 신중히 투여해야 한다.

4. 이상반응

- 이 약에서 보고된 이상반응
이 약에 대한 안전성은 당노병성 말초 신경병증 및 대소포진 후 신경통 환자를 대상으로 12주간의 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조제대조：프레가발린(속방캡슐) 임상시험(N=352)에서 평가되었다.
이상반응 발현률은 이 약 투여군 66.48%(117/176명, 237건), 프레가발린 캡슐 투여군 65.34%(115 /176명, 229건)로 군 간 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았다.
시험약과의 인과관계를 배제할 수 있는 약물이상반응(ADR은 이 약을 투여한 환자 중 108명(61.36%, 199건), 프레가발린 캡슐을 투여한 환자 중 101명(57.39%, 184건)에서 보고되었다. 가장 흔하게 보고된 이상반응은 이 약 투여군에서 어지러움 55명(31.25%), 출혈 25명(14.20%), 체중증가 20명(11.36%)등이었으며, 대조약 투여군에서는 어지러움 40명(22.73%), 출혈 28명(15.91%), 체중 증가 13명(7.39%)등이었다.
이상반응은 대체로 경증에서 중증등으로 나타났다.
【표 1】임상시험에서 1% 이상 보고된 이상반응

	프레가발린 처방정(N=176)	프레가발린 캡슐(N=176)
인상계	명(%)	명(%)
어지러움	55(31.25) 58	40(22.73) 42
출혈	25(14.20) 25	28(15.91) 29
두통	3(1.70) 3	3(1.70) 3
분롱분롱	2(1.14) 2	1(0.57) 2
기면	3(1.70) 3	0(0.00) 0
소화기계		
변비	14(7.95) 14	7(3.98) 7
소화불량	5(2.84) 6	7(3.98) 7
오심	1(0.57) 1	5(2.84) 5
구강건조	2(1.14) 2	2(1.14) 2
구토	2(1.14) 2	2(1.14) 2
복부팽만	0(0.00) 0	3(1.70) 3
조사		
체중증가	20(11.36) 20	13(7.39) 13
혈중CPK 증가	0(0.00) 0	2(1.14) 2
전신 및 투여부위		
말초부종	12(6.82) 12	12(6.82) 13
인면부종	6(3.41) 6	4(2.27) 4
심장		
심계항진	4(2.27) 4	7(3.98) 7
심계항진	2(1.14) 2	0(0.00) 0
눈		
시야흐림	3(1.70) 3	5(2.84) 5
피부 및 피하조직		
소양증	1(0.57) 1	2(1.14) 2
근골격계 및 결합조직		
관절통	2(1.14) 2	0(0.00) 0
대사 및 영양		
지혈당	1(0.57) 1	1(0.57) 1
감염		
코인두염	3(1.70) 4	2(1.14) 2
혈관계		
고혈압	0(0.00) 0	3(1.70) 3

② 프레가발린 캡슐 임상시험 경험에서의 이상반응

- 프레가발린 캡슐 임상프로그램에서는 12,000명 이상의 환자들에게

약물이 투여되었으며, 이 중 7,000명 이상의 환자들은 아명증상, 위약대조 임상시험에 참여한 환자들이었다. 가장 흔하게 보고된 이상반응은 어지러움 및 출혈이었고, 이상반응은 대체로 경증에서 중등도로 나타났다. 모든 대조임상시험에서 이상반응으로 인한 투여의 중단은 프레가발린을 투여한 환자의 14%, 위약을 투여한 환자의 5%에서 나타났다. 투여의 중단을 가져온 가장 흔한 이상반응은 어지러움 및 출혈이었다. 임상시험들의 통합 분석 (pooled analysis)에서 약물 관련으로 선택된 이상반응을 빈도에 의해 기원성(SOC) 및 빈도에 따라 기지하였다. 이런 용어들의 빈도는 임상시험자제 중 모든 인과관계가 있는 이상반응에 기초하였다.

- 매우 흔하게：≥1/10
- 흔하게：≥1/100, (1/10)
- 흔하지 않게：≥1/1000, (1/100)
- 드물게：(1/1000)

아래의 표에 기재된 이상반응은 기저질환 및/혹은 병용약물과 연관되어 나타날 수도 있다.

【표 2】임상시험 경험에서의 이상반응

기관계(SOC)	이상반응
감염	코인두염
흔한 및 림프계	
흔하지 않게	중상구임소증
대사 및 영양	
흔하게	식욕증가
흔하지 않게	식욕부진, 지혈당
정신계	
흔하게	혼돈, 방향감각장애, 자각과민성, 우울, 다행감, 성욕감소, 불면증
흔하지 않게	이인증, 성감이상증, 안절부절, 초조, 기분동요, 감정저하, 감정상승, 적절한 용어 찾기의 어려움, 환각, 비정상적인 꿈, 성욕증가
드물게	공황발작, 억제불능, 무감동
신경계	
매우 흔하게	어지러움, 출혈
흔하게	실조, 운동불조이상, 평형장애, 기억상실, 주의력 장애, 기억력 장애, 떨림, 구음장애, 감각이상, 감각저하, 진전, 출혈음
흔하지 않게	인지력장애, 안구진탕, 언어장애, 간대성근경련, 반사저하, 운동이상, 정신운동성 과민, 체위성어지러움, 자각과민, 적절함, 활동불림, 실신
드물게	혼민, 운동저해증, 후각이상, 미각소실, 필기장애
눈	
흔하게	시야흐림, 복시
흔하지 않게	간접시 상시장애(역시실), 시야장애, 시야총증, 광시증, 안구건조, 안구충장, 시력감소, 안구통증, 눈파로, 눈물분비증가, 안구 자극
드물게	신동, 진동시, 시야의 심도인지 변화, 사시, 시야 밝음(brightness)
귀 및 미로	
흔하게	현훈
흔하지 않게	청각과민증
심장계	
흔하지 않게	1도 발실자단, 빈맥, 동성서맥
드물게	동성빈맥, 동성부정맥
혈관계	
흔하지 않게	지혈당, 고혈압, 혼조, 안면홍조, 말초 냉증
호흡기계	
흔하지 않게	호흡근력, 비강염, 기침, 비출혈, 비염, 코골음
드물게	인후과민, 비출혈
소화기계	
흔하게	구토, 복부팽만, 변비, 구강건조, 고철(맹곡)
흔하지 않게	타액분비과다, 역류식도염, 구강강직 저하
드물게	복수, 연하곤란, 헛배림
피부 및 피하조직	
흔하지 않게	발한, 구진상 발진, 두드러기
드물게	시문염
근골격계 및 결합조직	
흔하게	근육경련, 관절통, 등통증, 사지통증, 저궁경부경련
흔하지 않게	관절충장, 근육통, 근육약화, 목의 통증, 근육경직
드물게	힘줄근통해
신장 및 비뇨기계	
흔하지 않게	배뇨장애, 요실금
드물게	요감소, 신부전
생식계 및 유방	
흔하지 않게	발기부전, 사정지연, 성기능장애, 월경통
드물게	무월경, 유방통, 유방방비발, 유방비대
전신이상 및 투여 부위	
흔하게	말초부종, 부종, 보행이상, 넘어짐, 취한느낌, 냉각이상, 피로
흔하지 않게	홍부초임강, 전신부종, 통풍, 발열, 오한, 무력, 갈증
감사	
흔하게	체중증가
흔하지 않게	열이나 아미노트랜스페라제(ALT) 증가, 혈중 크레아닌 보스포크나제 증가, 아스파테이트 아미노트랜스페라제(AST) 증가, 혈당 증가, 혈소판 수치 감소, 혈중 칼륨 감소, 체중감소
드물게	혈중 크레아티닌 증가, 백혈구 수치 감소

② 시판 후 조사에서 나타난 이상반응

- 국외 시판 후 경험
－면역계：흔하지 않게：과민성, 드물게：혈관부종, 알레르기 반응
－신경계：매우 흔하게：두통, 흔하지 않게：악성 소실, 정신 장애
－눈：드물게：각막염
－심장：드물게：울혈성 심부전
－호흡기계：드물게：폐부종
－소화기계：흔하게：구역, 설사, 드물게：허부종
－피부 및 피하조직：흔하지 않게：안면 부종, 가려움
－신장 및 비뇨기계：드물게：요자류
－생식계 및 유방：드물게：여성형 유방증
－전신이상 및 투여부위：흔하지 않게：관대
－빈도불명예의 소크, 아나필락시스 유사 증상, 피부점막양자후증군 (스티븐스－존슨 증후군), 다형홍반이 나타날 수 있으므로 잘 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취한다.
- 국내 시판 후 조사 결과

국내에서 제삼사를 위하여 6년 동안 3,926명을 대상으로 실시한 사용성적조사 결과 인과관계에 상관없이 유해사례 발현률은 4.96%(195 명/3,926명, 262건)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 있는 약물유해반응 발현률은 4.30%(169명/3,926명, 226건)이었다. 출혈이 1.73%(68명/3,926명, 68건)로 가장 많았고, 어지러움 1.71%(67명/3,926명, 67건), 구강건조 0.53%(21명/3,926명, 21건), 부종 0.31%(12명/3,926명, 12 건), 현훈 0.18%(7명/3,926명, 7건), 구토, 말초부종이 각각 0.13%(5명/3,926 명, 5건), 떨림, 경련약화가 각각 0.10%(4명/3,926명, 4건)순으로 나타났으며 그 밖에 0.1% 미만으로 보고된 약물유해반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다.

- －전신：피로, 무력, 보행이상
- －정신계：성욕감소, 수면장애, 불면증
- －신경계：운동실조, 구어장애, 감각이상, 기억력장애, 주의력 장애
- －소화기계：변비, 위장장애, 헛배
- －신장 및 비뇨기계：BUN증가, 요실금, 배뇨곤란
- －생식계 유발：발기부전
- －대사 및 영양：지혈당, 식욕증가
- －눈：복시, 시야흐림
- －귀 및 부속기관：귀울림
- －피부 및 피하조직：안면부종, 피부질환
- －감사：혈중크레아티닌증가, 체중증가

이 중 시판 전 임상시험에서 나타나지 않았던 예상되지 못한 약물유해반응은 경련약(8),10%(4명/3,926명, 4건), 위장장애, 귀울림, 수면장애, 피부질환, BUN증가, 혈변이 각각 0.03%(1명/3,926명, 1건)으로 보고되었다. 중대한 유해사례가 인과관계와 상관없이 2명에서 3건(대장암증, 위장염, 폐렴) 보고되었다.

신장애 환자에서 유해사례 발현률이 15.71%(11명/70명, 14건)로 높게 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물 유해반응은 10.00%(7명/70명, 10건)로 관찰되었다.

- 항간질약을 치료받은 환자는 자살충동 또는 자살행동, 우울증의 발현 또는 악화 및 기분과 행동의 비정상적 변화를 보인다. 11종의 다른 항간질약을 사용하여199개의 위약-대조 임상 시험(단독요법과 부가요법)을 분석한 결과 항간질약 복용환자는 위약 투여환자와 비교 시 약제와의 자살충동 또는 자살행동의 위험을 보였다. 12주의 치료기간 동안 자살행동 또는 자살충동 발생률은 27.864명의 항간질약 치료환자에서 0.43%였으며 16,029명의 위약 투여 환자에서는 0.24%였다. 이는 치료받은 530명 환자 중 한 명은 자살 충동 또는 자살 행동을 보인 것을 의미한다. 동 약물 치료 환자에서 4건의 자살이 있었고 위약 치료 환자에서의 자살은 없었다. 그러나 자살 예수가 너무 적어 이 약과 자살의 연관성을 결론짓는 수는 없다. 항간질약 복용에 의한 자살충동 또는 자살행동의 위험증가는 약물치료 시작 초기1주에 관찰되었고, 치료기간 동안 지속되었다. 대부분의 임상시험은 24주 이상을 초과할 수 없었으며 24주를 초과한 자살충동 또는 자살행동의 위험은 평가할 수 없었다. 자살충동 또는 자살행동 위험은 분석된 11종의 항간질약에서 일관적이었다. 다양한 작용기전과 사용범위를 가진 항간질약에서의 위험성 증가는 어떤 효능으로든 사용된 모든 항간질약에 대해서도 위험성이 있음을 나타냈다. 그 위험성은 분석된 임상시험에서 연령(5-100세)에 따라 차이가 나지는 않았다.

- 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2014년)를 분석한 결과, 이상사례 가 보고된 다른 약물들에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
－정신계：섬망
⑤ 시판 후 이상사례 보고자료(1989-2015년6월)를 토대로 심리약정보 분석：평가 결과, 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
－신경계：마비(얼굴마비)

5. 일반적 주의

- 환자 및 보호자에게 항간질약이 우울증의 징후 및 증상의 발현 또는 악화, 불안정적 기분과 행동의 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있음을 알려 환자에게 이러한 증상 또는 행동이 발현될 경우 즉시 의료전문가에게 보고될 수 있도록 한다.
- 이 약의 유효성은 당노병성 말초 신경병증 및 대상 포진후 신경통 환자를 대상으로 한 임상시험에서 입증되었다. 다른 신경병증성 통증에 대한 유효성은 평가되지 않았다.
- 운전 및 기계 사용에의 영향：이 약은 어지러움 및 출혈을 유발할 수 있다. 당노병성말초신경병증 및 대상포진 후 신경통 환자를 대상으로 한 12주간의 무작위 배정, 이중눈가림, 활성대조제대조：프레가발린(속방캡슐) 임상시험 에서, 이 약은 대조약보다 더 높은 빈도로 어지러움이 보고되었다(31.25% vs 22.73%). 이 약을 처방받은 환자들은 이 약이 환자들의 이런 활동에 영향을 주는지에 대해 알기 전까지는 이 약을 복용하는 동안 운전 및 복잡한 기계의 조작 혹은 잠재적인 위험성이 있는 활동을 하지 않도록 권고되어야 한다.
- 이 약 150mg을 3일간 반복투여한 임상시험 결과, 1일 2회 투여한 리라카립살에 비해 C_{max}가 약 1.2배에 증가하였다. 따라서 이 약 투여 시 프레가발린의 C_{max} 증가로 인한 잠재적 위험성특히 어지러움, 체중증가, 변비를 평가하고 환자를 면밀히 모니터링 해야 한다.

6. 상호작용

- 약과 다른 약물과의 약물상호작용에 대한 추가연구는 실시되지 않았다. 프레가발린에 대하여 알려진 약물상호작용 정보는 다음과 같다.
1) 프레가발린은 인체에서 거의 대사되지 않으며, 주로 미변화제로 노로 배설된다(2%미만의 용량만이 대사체로 노에서 재흡수 됨). in vitro 에서 약물의 대사를 저해하지 않으며, 혈장 단백질에 결합하지 않아 약동학적 상호작용을 유발하지 않고, 또한 이에 영향을 받지 않는 것으로 보인다.
2) In vivo시험에서 프레가발린과 페니토인, 카바마제핀, 발프로산, 리모트리진, 가바펜틴, 로라제람, 옥시코돈, 에탄올 사이에는 임상적으로 연관성 있는 약동학적 상호작용이 관찰되지 않았다. 모피딘에 대한 약동학적 분석에서 경구용 혈당강화제, 이소제, 인슐린, 페노바르비탈, 티아기반 및 토피라메이트는 프레가발린의 클리어런스에 임상적으로 유의적인 영향을 주지 않는 것으로 나타났다.
3) 프레가발린과 노르에피스테론 및/혹은 에지날 에스트라디올과 같은 경구피임제의 병용투여는 상호간의 혈장 상태의 약동학에 영향을 미치지 않았다.
4) 대조 임상시험에서 프레가발린과 옥시코돈, 로라제람, 에탄올의 다회 병용투여는 호흡에 임상적으로 중요한 영향을 미치지 않았다. 프레가발린은 옥시코돈으로 인해 발생한 인지력 및 운동기능의 감소에 영향을 미친다. 프레가발린은 에탄올 및 로라제람의 효과를 증가시킬 수 있다.
5) 시판 후 조사에서, 프레가발린과 다른 중추신경계 억제제를 복용한 환자에서 호흡부전과 혼수가 보고된 바 있다.
6) 시판 후 조사에서 아편유사 진통제와 같은 변비 유발 성분의 약물과 병용투여 시, 하부소화기계 기능 감소를을 들어, 장폐쇄증, 무력 장폐쇄증, 변비와 관련된 사례가 보고된 바 있다.
7) 고령의 지환자에서 약력학적 상호작용에 대한 연구는 행하여지지 않았다.

7. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 일부：일부약을 대상으로 프레가발린을 투여한 적절한 자료는 없다. 동물들 대상으로 한 시험에서 생식독성이 나타났으나, 인체에서의 잠재적인 위험성은 밝혀지지 않았다. 따라서, 이 약은 치료상의 유익성이 태아에 대한 위험성을 상회하는 경우를 제외하고는 일부에 투여하지 않는다. 기임여성에게 투여 시 효과적인 피임법을 실시해야 한다.
- 수유부：프레가발린은 수유부의 모유 중으로 이행된다. 영아에 대한 프레가발린의 안전성은 밝혀진바 없으므로, 프레가발린을 투여하는 동안 수유는 권장되지 않는다. 영아에 대한 모유수유의 유익성과 산모에 대한 치료의 유익성을 고려하여 모유수유를 중단할지 또는 프레가발린 투여를 중단할지 결정해야 한다.

8. 고령자(만 65세 이상)

고령자에서 연령 증가에 따라 프레가발린의 클리어런스는 감소하는 경향이 있다. 프레가발린의 경우 클리어런스의 감소는 고령에 따른 크레아티닌 클리어런스의 감소와 연관된다. 연령 증가에 따라 신기능이 저하된 환자에서 이 약의 용량조정이 필요할 수 있다.

9. 과량투여시의 처치

프레가발린 속방캡슐의 시판 후 조사에서 프레가발린의 과량투여 시 관찰된 가장 흔한 이상반응은 정동장애, 졸림, 혼돈 상태, 우울증, 등요, 안절부정이었다. 발작도 보고되었다. 프레가발린을 과량 투여 시, 일반적인 보조요법(supportive measures) 및 필요하다면 혈액투석이 필요하다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

11. 전문가를 위한 정보

1) 약리작용

프레가발린은 GABA(gamma-aminobutyric acid)의 유사체로서, 중추 신경계의 전위차 의존적 칼슘채널(Voltage-gated calcium channel)의 보조적 아단위(α2-βsubunit)에 결합하여 [3H]-gabapentin을 강력 하게 저해하는 작용을 가지고 있다.

2) 약동학적 정보

- 용량 관련 생물약제학적 비교자료
이 약의 용량에 따라 약동학적 특성을 평가하기 위한 시험이 수행되었다. 총 40명의 건강한 성인을 4군으로 나누어 군당 10 명씩 이 약 150, 300, 450, 600 mg을 저녁 표준식 식후 경구로 단회투여한 후 프레가발린의 농도를 측정하여 약동학 파라미터 AUC_{0-∞}와 C_{max}의 용량비례성을 평가한 결과, AUC_{0-∞}와 신회구간은 등등한계를 만족하였으나 C_{max}는 허용범위를 약간 벗어났다. 그러나 허용범위에 입합하기에 용량에 비례하여 증가 하는 경향을 보인다고 판단된다.
- 속방캡슐과의 약동학적 특성 비교
프레가발린캡슐과 이 약의 반복투여 시 약동학적 특성을 비교하기 위한 시험이 수행되었다. 총 24명의 건강한 성인을 두 군으로 나누어 2×2 교차시험으로 이 약 150 mg과 프레가발린캡슐 75 mg을 3일간 저녁 표준식 식후 반복 투여하여 항정 상태에서의 약동학적 지표를 비교 평가한 결과, 프레가발린의 AUCr(0-24) 기하평균비의 90% 신회구간은 생물학적동등성 기준범위 이내 이나, C_{max}mr 기하평균비의 90% 신회구간은 생물학적동등성 기준범위보다 다소 높게 나타났다.

- 시야명암 평가
공복 및 식후 경구투여 시 프레가발린캡슐과 이 약의 약동학적 특성을 비교하기 위한 시험이 수행되었다. 건강한 성인 30명을 3 군으로 나누어 3×6 교차시험으로 다음과 같이 투여하였다.
－시험군A：고지방 식이 후 프레가발린캡슐 75 mg 1일 2회 투여
－시험군B：고지방 식이 후 이 약 150 mg 1일 1회 투여
－시험군C：공복 상태에서 이 약 150 mg 1일 1회 투여
오전 고지방식이 후의 프레가발린캡슐 75 mg 및 이 약 150 mg은 약동학적 평가 결과, 프레가발린의 C_{max}의 평균치 차의 90% 신회구간은 생물학적동등성 기준범위 내에 있었으나 AUC_{0-∞}의 평균치 차의 90% 신회구간은 기준범위보다 약간 낮게 나타났다. 공복과 고지방식이 후 이 약 150 mg의 약동학적 평가 결과, AUC_{0-∞}과 C_{max} 모두 고지방식이 후의 결과가 다소 높게 나타남을 확인 하였다.

3) 임상시험 진행

이 약의 유효성과 안전성은 말초 신경병증성 통증 환자(당노병성 말초 신경병증 및 대상포진 후 신경통)를 대상으로 수행된 무작위배정, 이중눈가림, 활성약 대조, 평행, 다기관, 치료적 확증 임상시험에서 평가되었다. 시험대상자는 1주간의 스크리닝 기간 동안 도입기 위약을 1일 2회 투여 받게 되며, 평균 통증 점수(OPRS)가 4점 이상 9 점 미만인 환자, 352명을 무작위 배정시험군：176명, 대조군 176 명)하여 시험군에게는 이 약, 대조군에게는 프레가발린캡슐을 투여 하였다.

첫 4주간의 용량 조절 기간을 가졌으며, 초기 임상시험용약의약품의 용량은 150 mg/day 이었으며, 4주 동안 1주 간격으로 1단계(150mg 1단위씩 최고 600 mg/day까지 증량할 수 있었다. 4주간의 용량조절 기간을 완료한 대상자는 최종 복용 용량으로 8주간의 용량 유지 기간 동안 투여 후 말초 신경병증성 통증에 대한 증상 조절 효과 및 안전성을 비교 평가하였다.

일차 유효성 평가 변수인 총류시점(12주)의 평균 통증 점수(OPRS)를 확인한 결과, 시험군은 3.08 ± 0.14 점, 대조군은 3.18 ± 0.14 점으로 두 군간의 평균 통증점수의 차이는 미리 정한 임상적 허용한계 미만으로 시험군은 대조군과 비교하여 비열등함을 보였다.

4) 독성시험 진행

- 동물에 대한 약리학적 안전성 시험 결과 프레가발린은 임상적으로 연관된 용량에서 내약성이 양호한 것으로 나타났다. 랫드 및 원숭이에 대해 실시한 반복투여 독성시험에서 활동감소, 활동증가 및 운동실조와 같은 중추신경계에 대한 영향이 관찰되었다. 임상 최고 추천 용량에서의 인체 평균 노출의 5배 이상에 해당되는 용량에 장기간 노출된 고령의 abino 랫드에서 발달독성 빈도의 증가가 관찰되었다.
- 프레가발린은 마우스, 랫드, 혹은 토기에서 태자독성을 유발하지 않았다. 랫드 및 토기에서의 태자독성은 인체 투여용량보다 상당히 높은 고용량에 노출된 경우에만 나타났다. 출생 전후에 대한 독성시험에서 프레가발린은 인체 최고 추천용량의 2배 이상의 용량에 노출시킨 랫드의 태자에서 발달독성을 나타내었다.
- 프레가발린은 in vitro 및 in vivo 시험의 결과로 볼 때 유전독성을 나타내지 않았다.
- 프레가발린은 랫드 및 마우스를 대상으로 2년 발암성 시험을 실시하였다. 인체 추천 최고용량의인 1일 600 mg에서의 평균 인체 노출과 비교하여 2배의 인체 평균 노출에 해당하는 용량에 노출된 랫드에서 종양은 관찰되지 않았다. 또한, 평균 인체 노출용량과 비슷한

용량에 노출된 마우스에서 종양빈도의 증가는 관찰되지 않았다. 그러나 고용량의 노출에서 혈관육종 빈도의 증가가 관찰되었다. 마우스에서 프레가발린으로 유도된 종양형성의 기전은 헬스판 변화 및 내피세포증식과 연관된 비유전적인 기전이었다. 단기간 및 제한된 장기간의 임상자료를 근거로 랫드 및 인체에서는 헬스판변화가 나타나지 않았다. 따라서 이것과 연관된 인체에서의 위험성의 증가는 없다.