

프롤로정

1밀리그램

2밀리그램

(프루칼로프라이드속신산염)

**[원료약품 및 그 분량]**  
프롤로정1밀리그램 1정 중  
■ 유효성분 : 프루칼로프라이드속신산염(별규) ..... 1.321mg  
(프루칼로프라이드로서 1mg)  
■ 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)  
■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이흰색(03B28796), 이산화규소  
프롤로정2밀리그램 1정 중  
■ 유효성분 : 프루칼로프라이드속신산염(별규) ..... 2.642mg  
(프루칼로프라이드로서 2mg)  
■ 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)  
■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이분홍(03B84892), 이산화규소

**[성상]**  
1mg : 흰색의 원형 필름코팅정  
2mg : 분홍색의 원형 필름코팅정

**[효능·효과]**  
원하제 투여로 증상완화에 실패한 성인에서 만성변비 증상의 치료

**[용법·용량]**  
이 약은 경구투여하며 식사와 관계없이 하루 중 어느 때나 투여 가능하다.  
성인 : 1일 1회 2mg  
65세 이상의 고령자 : 초기 투여량은 1일 1회 1mg이며, 필요 시 1일 1회 2mg로 증량할 수 있다.  
신장애환자 : 중증의 신장애환자(GFR < 30 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)에게는 1일 1회 1mg을 투여한다. 경증에서 중증증의 신장애 환자에게는 용량조절이 필요하지 않다.  
간장애환자 : 중증의 간장애 환자(Child-Pugh class C)에게는 1일 1회 1mg을 투여한다. 경증에서 중증증의 간장애 환자에게는 용량 조절이 필요하지 않다.  
이 약의 특수한 작용기전(연동운동의 자극) 때문에 1일 2mg을 초과하는 것은 효과를 증가시키는 것으로 기대되지 않는다.  
이 약을 1일 1회 4주간 투여 후 효과가 없는 경우, 환자를 다시 검사하여 치료 지속 여부에 대해 재평가하여야 한다.  
이 약의 유효성은 3개월간의 이중맹검 위약 대조군 임상시험에서 확립되었다.  
3개월 이상 치료가 계속될 시 유효성은 정기적으로 재평가되어야 한다.

**[사용상의 주의사항]**  
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것  
1) 이 약의 주성분 및 이 약의 첨가제에 과민반응이 있는 환자  
2) 투석이 필요한 신장애 환자  
3) 장벽의 기능적 또는 구조적 이상으로 인한 장천공 또는 장폐쇄 환자, 장폐색증(obstructive ileus), 크론병과 같은 장관의 중증 염증 상태, 궤양성 대장염 및 독성 거대결장/거대직장 환자  
4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중투여 할 것  
1) 신배설은 이 약의 주된 소실 경로이므로 중증의 신장애 환자(GFR < 30 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)에게는 1일 1회 1mg의 용량으로 감량 하여 주의하여 투여한다.(이 약 2mg 단위 투여 후 정상 신기능을 가진 시험대상자와 혈중 약물 농도(AUC) 비교 시, 중증의 신장애환자 (Cl<sub>CR</sub> ≤ 24mL/min/1.73 m<sup>2</sup>)에서의 이 약의 혈중 약물 농도(AUC)는 건강한 지원자에서 보다 2.3 배 높았다.)  
2) 중증이며 임상적으로 불안정한 동반질환(예, 간질환, 심혈관질환, 폐질환, 신경계 또는 정신계이상, 악성종양 또는 에이즈, 기타 내분비장애)을 가진 환자들에 대해서는 연구되지 않았다. 이러한 환자들에게 이 약을 처방할 때 주의를 기울여야 한다.  
3) 이 약은 부정맥 또는 허혈성 심혈관질환의 병력을 가진 환자들에게는 주의하여 사용하여야 한다.  
4) 간장애는 이 약의 사람에서의 대사 및 노출에 임상적으로 유의한 영향을 미칠 것으로 보이지 않는다. 경증, 중증증 또는 중증의 간장애 환자들에 대한 자료는 없으므로 중증의 간장애 환자(Child-Pugh class C)에게는 더 낮은 용량이 권장되며 1일 1회 1mg의 용량으로 감량하여 주의하여 투여한다.  
5) 이 약은 QTc 연장을 일으키는 것으로 알려진 약물과 병용투여시 주의해야 한다.

3. 이상반응  
만성변비 환자를 대상으로 한 대조 임상시험에서 약 2,700명의 피험자에게 이 약이 경구로 투여 되었다. 이 환자들 중 약 1,000명의 피험자에게 권장용량인 이 약 1일 2mg을 투약하였고, 약 1,300명의 피험자에게 이 약 1일 4mg을 투약하였다. 임상개발단계에서 이 약의 총 노출은 2,600인년이 넘었다. 이 약과 관련하여 가장 빈번하게 보고된 이상약물반응은 두통 및 위장관계 증상(복통, 구역 또는 설사)으로 각각 약 20%의 환자에게서 나타났다. 이상약물반응은 치료 초기에 주로 발생하였고 일반적으로 치료가 계속되면서 수일 이내에 사라졌다. 다른 이상약물반응도 때때로 보고되었다. 이상반응의 대부분은 경증에서 중증중이었다.  
다음의 이상반응이 권장용량 2mg의 대조 임상시험에서 보고되었으며 다음과 같이 분류되었다. 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥ 1/100 에서 <1/10), 흔하지 않게(≥1/1,000 에서 <1/100), 드물게(≥1/10,000 에서 <1/1,000), 매우 드물게(< 1/10,000). 각 빈도 별로 이상반응은 중대성이 높은 순서로 나타내었다. 빈도는 대조 임상시험 결과에 근거하여 계산되었다.  
대사 및 영양장애  
흔하지 않게: 식욕부진  
신경계 장애  
매우 흔하게: 두통  
흔하게: 어지러움  
흔하지 않게: 떨림  
심장 장애  
흔하지 않게: 두근거림  
소화기계장애  
매우 흔하게: 구역, 설사, 복통  
흔하게: 구토, 소화불량, 직장출혈, 고창, 창자소리이상  
신장 및 비뇨기관 장애  
흔하게: 빈뇨증  
전신 장애 및 투약부위 장애  
흔하게: 피로  
흔하지 않게: 열, 권태감  
투약 이후 첫날부터, 가장 흔한 이상반응은 이 약 투여군과 위약 투여군에서 유사한 빈도로 나타났으며(이 약과 위약군에서의 발현 빈도 차이는 1% 미만), 구역과 설사는 이 약 투여군에서 더 빈번하게 나타났으나 현저하지는 않았다(이 약과 위약군에서의 발현 빈도 차이는 1%~3%).  
심장 두근거림은 위약군에서 0.7%, 이 약 1mg 투여군에서 0.9%, 이 약 2mg 투여군에서 0.9%, 이 약 4mg 투여군에서 1.9%로 보고되었다. 환자의 대부분은 이 약의 치료를 계속하였다. 심장 두근거림이 새로 발생하면 환자들은 담당의사와 상담해야 한다.

4. 일반적 주의  
중증의 설사의 경우, 경구용 피임약의 효과가 감소할 수 있으므로 경구 피임의 실패 가능성을 막기 위하여 추가적인 피임법의 사용을 권장한다.

5. 상호작용  
1) In vitro data는 이 약의 상호작용 가능성이 낮음을 보여주며, 이 약의 치료농도에서는 다른 병용투여 약물의 CYP-매개 대사과정에 영향을 주지 않을 것으로 기대된다. 이 약이 P-글리코프로테인(P-gp)에 대한 약한 기질일 수는 있으나, 임상적으로 유의한 농도 에서 P-글리코프로테인의 저해제는 아니다.  
2) CYP3A4 및 P-gp의 강력한 저해제인 케토코나졸(200mg 하루 2번 투여)은 이 약의 전신 노출을 약 40%까지 증가시킨다. 이 영향의 임상적 유의성은 미미하며 P-gp로 매개되는 신장 수송을 저해시키기 때문인 것으로 보여 진다. 케토코나졸에서 관찰되는 것과 유사한 정도의 상호작용이 베라파밀, 사이클로스포린 A 및 퀴니딘 같은 강력한 P-gp 저해제에서 일어날 수 있다. 이 약은 또한 다른 신장 수송체를 통해 분비될 수 있다. 이 약의 능동 분비(P-gp 포함)와 연관된 모든 수송체에 대한 저해는 이론상 이 약의 노출을 75%까지 증가시킬 수 있다.  
3) 건강한 피험자를 대상으로 수행된 연구에서 이 약은 와파린, 디곡신, 알코올 및 파록세틴 또는 경구용 피임약의 약동학에 임상적 으로 유의한 영향을 끼치지 않는다는 것을 보여주었다. 프루칼로프라이드와 병용치료시 에리스로마이신의 혈중농도가 30% 증가 하였다. 이 상호작용에 대한 메커니즘은 완전히 알려져 있지 않지만, 이것은 이 약의 직접적인 영향이라기보다 역동학적으로 에리 스로마이신이 높은 내인적 다양성을 가지고 있기 때문임을 지지하는 자료가 있다.  
4) 프로베나이드, 시메티딘, 에리스로마이신 및 파록세틴의 치료용량은 이 약의 약동학에 영향을 주지 않았다.  
5) 이 약은 QTc 연장을 야기하는 것으로 알려진 약과 병용 투여 시 주의를 기울여야 한다.  
6) 이 약의 작용기전 때문에 아트로핀 유사 물질의 사용은 이 약의 5-HT<sub>4</sub> 수용체 매개 효과를 감소시킬 수 있다.  
7) 음식과의 상호작용은 관찰되지 않았다.

6. 임부, 수유부에 대한 투여  
1) 임부  
임부에서 이 약 사용에 대한 경험은 제한적이다. 임상시험 중 자연유산 사례가 관찰되었으나 다른 위험요소들이 있었기 때문에 이 약과의 인과관계는 알려지지 않았다. 동물시험에서는 임신, 배태자 발달, 분만 혹은 출생 후 발달과 관련된 직접적 또는 간접적인 유해영향을 보이지는 않았다. 이 약을 임신 중에 사용하는 것은 권장되지 않는다. 가임기 여성은 이 약으로 치료받는 동안 효과적인 피임법을 사용하여야 한다.  
2) 수유부  
이 약은 유즙으로 분비된다. 그러나 이 약의 치료용량에서 모유를 먹는 신생아 및 영아에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다. 사람을 대상으로 한 자료가 없으므로 이 약을 수유기간에 사용하는 것은 권장되지 않는다.

7. 소아에 대한 투여  
이 약은 18세 미만의 청소년 및 어린이에게 투여하는 것은 권장되지 않는다.

8. 과량투여시의 처치  
건강한 지원자를 대상으로 한 연구에서 이 약은 1일 1회 20mg(1일 치료 권장 용량의 10배)까지 용량을 점차 증량하였을 때 좋은 내약성을 보였다.  
과량 투여시 이 약의 알려진 약리 효과가 지나치게 발현되어 두통, 구역 및 설사 등이 나타날 수 있다. 과량 투여시 특별한 조치는 없으나, 환자의 증상에 따라 적절하게 대증적 치료를 하도록 한다.  
설사 및 구토로 인한 과량의 체액 손실이 일어난 경우, 전해질 보충이 필요할 수 있다.

9. 적응상의 주의  
운전하거나 기계를 사용하는 능력에 있어서 이 약의 영향에 관한 연구는 수행되지 않았다. 이 약은 특히 복용 첫날 어지러움 및 피로의 발생과 연관이 있으며 이는 운전과 기계사용에 영향을 줄 수 있다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항  
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.  
2) 습기를 피하여 원래의 용기에 보관한다.

11. 의약품동등성시험 정보<sup>\*)</sup>  
가. 시험약 프루칼로프라이드속신산염정2밀리그램(주)유영제약)과 대조약 레졸로정 2밀리그램(프루칼로프라이드속신산염)((주)한국안센)을 2X2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 36명의 혈중 프루칼로프라이드 농도를 측정한 결과, 비교평가 항목치(AUCt, C<sub>max</sub>)를 로그변환하여 통계처리 하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내 로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

| 구 분                                                                                                  |                                          | 비교평가항목                              |                             | 참고평가항목                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                      |                                          | AUC <sub>0-96hr</sub><br>(ng·hr/mL) | C <sub>max</sub><br>(ng/mL) | T <sub>max</sub> (hr) | t <sub>1/2</sub> (hr) |
| 대조약                                                                                                  | 레졸로정2밀리그램<br>(프루칼로프라이드속신산염)<br>((주)한국안센) | 106.0±13.4                          | 5.908±1.358                 | 1.50<br>(1.00~3.50)   | 22.25±3.84            |
| 시험약                                                                                                  | 프루칼로프라이드속신산염정<br>2밀리그램<br>((주)유영제약)      | 106.5±18.4                          | 5.972±1.244                 | 1.00<br>(1.00~2.50)   | 21.50±3.18            |
| 90% 신뢰구간*<br>(기준 : log 0.8 ~ log 1.25)                                                               |                                          | log<br>0.9820~1.0324                | log<br>0.9724~1.0696        | -                     | -                     |
| (AUC <sub>t</sub> , C <sub>max</sub> , t <sub>1/2</sub> ; 평균값±표준편차, T <sub>max</sub> ;중앙값(범위), n=36) |                                          |                                     |                             |                       |                       |
| AUC <sub>t</sub> : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적                                              |                                          |                                     |                             |                       |                       |
| C <sub>max</sub> : 최고혈중농도                                                                            |                                          |                                     |                             |                       |                       |
| T <sub>max</sub> : 최고혈중농도 도달시간                                                                       |                                          |                                     |                             |                       |                       |
| t <sub>1/2</sub> : 말단 소실 반감기                                                                         |                                          |                                     |                             |                       |                       |
| * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간.                                                                     |                                          |                                     |                             |                       |                       |

나. 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 프루칼로프라이드속신산염정1밀리그램(주)유영제약)은 대조약 프루칼로프라이드속신산염정2밀리그램((주)유영제약)과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출 양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

취. 이 약은 (주)유영제약 프루칼로프라이드속신산염1밀리그램 및 2밀리그램과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정 을 (주)유영제약에 위탁 제조하였음.

12. 기타  
1) 이 약은 동물시험에서 수컷 및 암컷의 생식능력에 영향을 끼치지 않았다.  
2) 심혈관계 파라미터가 강조된 일련의 확장된 안전성 약리시험 결과, 마취된 돼지에 정맥투여 후 관찰된 심박수와 혈압이 중증도로 증가하고 의식있는 개에서 일시(bolus) 정맥주사 후 혈압의 증가가 나타난 점을 제외하고는 이 약은 혈액학적 및 ECG 파라미터 (QTc)에 유의한 변화를 나타내지 않았다. 이는 마취된 개나 경구투여 후 유사한 혈장농도에 도달한 개에서는 관찰되지 않았다.

**[저장방법]** 차광기밀용기, 습기를 피하여 실온(~30℃)보관

**[포장단위]** 28정(7정/PTP포장(Alu-Alu)X4)

**[제조외역지]** 하나제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13~39  
**[제조자]** (주)유영제약 충청북도 진천군 공혜원면 용소2길 33

※ 의약품용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하세요.  
※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 소비자 상담전화 : 080-577-8004(수신자 요금 부담서비스)로 문의하여 주십시오.

작성 연월일 : 2018. 12. 18. <A01>

HanaPharm

하나제약

주식회사

하길공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-39