

일반의약품 | 분류번호 : 316

1캡슐

육체피로 · 체력저하

파워센 연질캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

· 유효성분 : 니코틴산아미드(KP) ... 20mg, 리보플라빈(KP) ... 3mg,
아스코르브산(KP) ... 60mg, 티아민염산염(KP) ... 2mg, 레티놀팔미
테이트유(KP) ... 5mg(비타민A로서 5000 I.U), 토코페롤아세테이트
(KP) ... 10mg(비타민E로서 10 I.U), 피리독신염산염(KP) ... 3mg

· 첨가제(타르색소) : 적색4호, 청색1호, 황색4호

· 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴, 전분, 카복시, 기타 첨가제 : 레시틴,
콩기름, 팜유, 백랍, 농글리세린, D-소르비톨, 에틸바닐린, 산화티탄

[성상] 황갈색의 유상물질을 든 알갱이 형태의 연질캡슐

[효능·효과] 다음 경우의 비타민 A, B1, B2, B6, C의 보급 : 육체
피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력
저하시, 노년기, 노약자 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과
같다. - 눈의 건조감의 완화, - 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)


[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 1회 복용한다.

[저장방법] 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나
변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 작성일 : 2019. 02. 01. (Rev.0) ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900

제조번호 : 1901 | 사용기한 : 2022.02.07.



(01)08806562049318

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로
임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말
것(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만
3개월 미만의 젖먹이 (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 (1) 레보도파 4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기
전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것 (1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 고옥살산
노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성,
수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한
여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경종 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증자가 추정된다는 역학조사
결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는
경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등
으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한
주의를 한다. (5) 동통환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자 (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)
염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 (7) 이 약은 황색(호/타르타르)를 함유
하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 5. 다음과 같은 경우 이
약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 가능한 이 첨가물서를 소지할 것 (1) 이
약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 동통성 관절부종(부기),
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라
지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경우구 피임제를
복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전혈관 막힘증의 위험이
증가될 수 있다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량
으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이
나타날 수 있다. (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance
impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재
하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (7) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴)로부터 전환된 것을 제외한
섭취는 폐경기를 지닌 여성의 골다공증(뼈약성증) 위험을 높일 수 있다. (8) 우발적으로 과량복용 한 경우 (9) 1개월
정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬
것 (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인
식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. (4) 각종 요검사에
혈당의 검출을 방해할 수 있다. (5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (6) 지방과부하로
특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의
체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에
투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
7. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가
적은 서늘한 곳에 보관할 것 (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것