



8 806265 012411

같이 조심하세요~

[일반약물]

판피린<sup>®</sup> 알파장

## [유효성분] 이 약 1정(78.6mg) 중

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 아세트아미노펜(주)         | 400mg  |
| 클로르페니라민말레이트(주)     | 2.5mg  |
| DL-에페드린(주)염산염(주)   | 20mg   |
| 클로페라산(주)염산염(주)     | 16mg   |
| 카페인(무수물(주))        | 30mg   |
| 리보플라빈(주)           | 4mg    |
| 푸로시타이드(주)          | 8.3mg  |
| 아스코르빈산(9%과립(당류))   | 85.8mg |
| (아스코르빈산으로서 83.3mg) |        |

## [참가제(비료성분)] 황산화

[기타 첨가제] 감질무수구연산, 경화실리콘, 스테아르산마그네슘, 오파드라아미B II, 노란색8A620050, 오파드라아미B II, 노란색9A, 자하도트르프도말발포로소, 코보르도

## [성상] 노란색의 정형형 원통과 둥근

[효능·효과] 감기의 증상상 여러 증상을 완화, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한증과 열리는 증상, 발열, 두통, 관절염, 근육통의 완화

[용법·용량] 성인 1회 1정, 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

## [사용상의 주의사항]

## 1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.
- 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 간기능 이상(급성 전신성 발진성 고열증후군(AIG), 스티븐스-존슨 증후군(SSJ), 독성 표피괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부 반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 후에 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다.
- 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜은 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용해서는 안 되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아
- 4) MAO의제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항마진제)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내약(비염)용 경구제, 임피인, 알레르기약 등

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 양이 있거나 15세 미만의 어린이(구약이나 구토를 수반하는 증상의 변화가 있다면 드물지만 심각한 열성성 라이증후군 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하거나, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만의 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 3) 임신, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기면치진, 알레르기성비염, 편두통, 음식불내증(알레르기 등을

같이 조심하세요~

판피린<sup>®</sup> 알파장

일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

- 4) 지름까지 약에 알레르기 증상에 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산(이)장장애, 녹내장(눈의 통증, 눈이 침침함 등), 폐노란 등 이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 아스피린, 위부불쾌감 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 일부 또는 임신과 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람  
흔한 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기래가 동반되는 기침 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 10) 이 약은 황색5호(산발열로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하도록 합니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단하거나 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나는 경우  
발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 두통, 폐노란, 목마름(자극이거나 산한, 어려움, 발열, 발진, 발열, 발진 등)  
2) 이 약의 복용에 의해 다음의 중증 증상이 나타나는 경우  
1) 속(이)복(위)사: 복통, 구토, 두드러기, 부종, 가슴압박감과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.  
2) 피부발진(중증성 스티븐스-존슨 증후군, 중독성 표피괴사증(리들 증후군)): 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신으로, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다.  
3) 천식  
4) 간기능장애: 천식의 나쁜환, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다.  
5) 간기능장애: 기침을 동반하고, 속이 차고, 오한, 고열, 발열 등이 나타납니다.  
3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 잠기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 복용시에는 음주하지 마십시오.
- 4) 복용하는 동안 음용이 있는 경우라도 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 5) 비록 비발열 약, 감기약, 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다양한 아세트아미노펜을 투여하는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 할 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기 실온(15~30°C)보관

[포장단위] 10정/PTP

[부작용 보고 및 피해구제 신청] 한국의약품안전관리원(644-6223)

\*이 첨부서 작성시 이후 변경된 내용은 동아제약 홈페이지([www.daejeam.com](http://www.daejeam.com))에서 확인하실 수 있습니다.

\*이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

\*구입시 사용기한이 경과되었거나 소문된 약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-620-2000(고객문의)

본 등록번호

작성일자: 2018. 02. 11

PANA10-08001

[제조업체]

주 동아제약

본사: 서울특별시 용인구 천호로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백학로 200-23(3, 2A, 4A)

[제조업체]

주 동아ST

본사: 서울특별시 용인구 천호로 64

공장: 충청남도 천안시 서북구 백학로 200-23(3, 2A, 4A)