일반의약품
분류번호 : 316

활성형 종합비타민제

인터큐텐 연질캡슐

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 인터큐텐연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 토코페롤아세테이트(비타민E로서 200IU) ····· 200mg
 - 아스코르브산 ····· 500mg
 - β-카로틴(천연유래) ····· 10mg
 - 유비데카레논 ····· 10mg
 - 산화아연(아연으로서 14mg) ····· 17.43mg
 - 셀레늄가루(0.1%)(셀레늄으로서 25μg) ····· 25mg
 - 우르소데옥시콜산 ····· 10mg
 - 루르설티아민 ····· 10mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호
- 첨가제(동물유래성분): 숙신산젤라틴소의 가죽)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 중쇄트라글리세리드, 카르나우바납, 콩기름

[성상] 적갈색의 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

다음 경우의 비타민 A, C, B, E 보급

– 육체피로 – 임신 · 수유기 – 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시 – 노년기

이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

– 눈의 건조감의 완화 – 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) – 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착기미, 주근깨의 완화 – 잇몸 출혈 · 비출혈(코피) 예방 – 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(2) 만 12개월 미만의 젖먹이

(3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

(4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

(3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 마숙아, 유아 : 외국에서 임신 전 3개월부터 임신 초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경륜 등을 중심으로 하는 기형발현기형 발생 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

(4) 소화성궤양, 만성췌장성대장염, 국한성특정 부분에 나타나는대장염 등의 위장질환 환자

(5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

(6) 신장(콩팥)장애 환자

(7) 저단백혈증 환자

(8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

(9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

(10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 구내염(입안염), 피부염, 땀 · 호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증(혈관 막힘증)의 위험이 증가될 수 있다.

(4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

(5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

(6) 장기간 고용량의 비타민A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있다.

(7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

(8) 우발적으로 과량복용 한 경우

(9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

(2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.

(3) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

(5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 연질캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.

[포장단위] 60캡슐

[제조자] ㈜서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

[제조의뢰자] 경남제약㈜ 충청남도 아산시 신창면 서부남로750번길 49

[판매자] ㈜인트피아 부산광역시 동래구 연안로 68 안락동 미나빌딩 3층

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.
3. PTP포장을 개봉하여 복용 시 가끔 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인 하시고 복용하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.
(소비자 상담전화: 051-532-2667~8)

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁 해결기준"에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관「http://drug.mfds.go.kr」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.

LEMONA 경남제약㈜

첨부문서 작성연월일 2019. 02. 11

SHPP0326-J01